

キノンドー顆粒水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	有機銅を含む農 薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病 黒点病 褐斑病 すす点病 すす斑病 炭疽病	1000	200～700	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内(塗布は3 回以内、散布は4 回以内)
なし	黒星病 黒斑病 輪紋病			収穫3日前まで	9回以内		12回以内(塗布は 3回以内、散布は9 回以内)
おうとう	褐色せん孔病			収穫終了後～落 葉期まで	3回以内		6回以内(塗布は3 回以内、散布は3 回以内)
かき	炭疽病 落葉病 うどんこ病			収穫14日前まで	5回以内		8回以内(塗布は3 回以内、散布は5 回以内)
ぶどう	枝膨病 黒とう病 べと病			収穫45日前まで	4回以内(開 花後は1回)		7回以内(塗布は3 回以内、散布は4 回以内(但し開 花後は1回以内))
かんきつ (みかんを除く)	そうか病 黒点病 灰色かび病			収穫30日前まで	3回以内		3回以内
みかん			5回以内	5回以内			
キャベツ	黒腐病		100～300	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
はくさい	軟腐病			収穫30日前まで	5回以内		5回以内
レタス	腐敗病 軟腐病 斑点細菌病			収穫21日前まで			
きゅうり	べと病	収穫前日まで					