キノンドー水和剤40

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 黒点病	500～800	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
かき	炭疽病 うどんこ病 落葉病	500			5回以内		8回以内（塗布は3回以内、散布は5回以内）
なし	黒星病 黒斑病	800～1000		収穫3日前まで	9回以内		12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	600～800					
もも	縮葉病	500～800		発芽前～開花直前まで　但し収穫60日前まで	5回以内		8回以内（塗布は3回以内、散布は5回以内）
ネクタリン		700～800		発芽前～開花直前			5回以内
みかん	黒点病	400～500		収穫30日前まで			
	そうか病 黄斑病	500					
ぶどう	べと病 枝膨病	600		収穫45日前まで	4回以内（開花後は1回）		7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内（但し開花後は1回以内））
	黒とう病	600～800					
ホップ	べと病	600			3回以内		3回以内
メロン	べと病 炭疽病	800～1000	100～300L/10a	収穫10日前まで	5回以内		5回以内
	斑点細菌病	600～800					
	果実汚斑細菌病	800					
すいか	べと病 炭疽病	800～1000					
	果実汚斑細菌病	800					
かぼちゃ	べと病 炭疽病	800～1000		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
はくさい	軟腐病	800		収穫30日前まで	5回以内		5回以内
レタス	腐敗病	600～800		収穫21日前まで			
	斑点細菌病 軟腐病 べと病	600					
やまのいも	葉渋病			収穫14日前まで			
こんにゃく	腐敗病 葉枯病	500～600		収穫30日前まで	8回以内		8回以内
キャベツ	黒腐病	500～800		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
ブロッコリー	黒腐病 黒斑細菌病	800					
たまねぎ	軟腐病	600					
きゅうり	斑点細菌病	600～800		収穫前日まで	5回以内		5回以内
	べと病 炭疽病	800～1000					
しそ	斑点病	1000			4回以内	株元散布	4回以内
芝	雪腐病	100～200	0.5～1L/㎡	根雪前	3回以内	散布	5回以内
シクラメン	葉腐細菌病	5	2～5ml/株	発病初期	4回以内	葉柄基部散布	
せんりょう	立枯病	1000	3L/㎡		8回以内	灌注	8回以内
	炭疽病	800	100～500L/10a			散布	