

## シトラーノフロアブル

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	有機銅を含む 農薬の総使用 回数	TPNを含む農薬 の総使用回数		
りんご	斑点落葉病 黒点病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 モニリア病 炭疽病	1000	200～700	収穫45日前 まで	3回以内		7回以内(塗布 は3回以内、散 布は4回以内)	3回以内		
西洋なし	ごま色斑点病 輪紋病			収穫30日前 まで					12回以内(塗布 は3回以内、散 布は9回以内)	3回以内(休眠期 は1回以内)
かき	炭疽病 落葉病 うどんこ病			着色期前ま で但し、収穫 30日前まで					8回以内(塗布 は3回以内、散 布は5回以内)	3回以内
きゅうり	褐斑病 べと病 斑点細菌病	1000～1200	100～300	収穫前日ま で	5回以内	散布	5回以内	14回以内(土壌 灌注は2回以内、 散布、常温煙霧、 くん煙及びエア ゾール剤の噴射 は合計12回以内)		
キャベツ	黒腐病 べと病			収穫14日前 まで	2回以内			3回以内(は種又 は定植前の土壌 混和は1回以内、 散布、無人航空 機及びエアゾ ール剤の噴射は合 計2回以内)		
はくさい	軟腐病 べと病 白斑病			収穫30日前 まで	3回以内			3回以内(は種又 は定植前の土壌 混和は1回以内、 散布は2回以内)		
レタス	すそ枯病 腐敗病 べと病			収穫21日前 まで					5回以内(土壌混 和は2回以内、散 布は3回以内)	
	軟腐病	1000								
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	1000～1200	100～400	収穫開始3日 前まで	4回以内	無人航 空機による散布	5回以内	4回以内		
しょうが	白星病 紋枯病	1000	100～300	収穫14日前 まで	5回以内			5回以内		
		16	3.2							
やまのいも	炭疽病 葉洪病	1000～1200	100～300	収穫30日前 まで		散布		6回以内		