

カナメフロアブル

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	インピルフル キサムを含む 農業の総使用 回数	
かんきつ	灰色かび病	4000~8000	200~700	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	黒点病 そうか病							
りんご	黒星病 すす点病 すす斑病 斑点落葉病 うどんこ病 褐斑病 黒点病 モニリア病 赤星病	4000						
	なし	黒星病 赤星病						4000~8000
		黒斑病 輪紋病						4000
	もも	灰星病						4000~8000
		黒星病 うどんこ病						4000
	ネクタリン	灰星病						4000~8000
ぶどう	黒とう病 さび病 うどんこ病 褐斑病	4000						
	灰色かび病	4000~8000						
かき	うどんこ病 灰色かび病 落葉病	4000						
麦類	雪腐小粒菌核病	2000~4000	60~150	根雪前	2回以内	散布	4回以内(根雪前は2回以内、根雪後は2回以内)	
	赤さび病	4000~8000		収穫7日前まで				
	うどんこ病							
だいず	白絹病	4000	100~300	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
豆类(種実、ただし、あずき、そらまめ、だいず、らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病							
豆类(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)								
さやえんどう あずき そらまめ 未成熟そらまめ	菌核病 さび病 灰色かび病							
ばれいしょ	黒あざ病	400	—	植付前	1回	種いも瞬時浸漬	1回	
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病	4000	100~300	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
	灰色腐敗病							
ねぎ	さび病	4000~8000						
	白絹病							
	黒腐菌核病							
	黒斑病 葉枯病	4000						
きく	白さび病	4000~8000						発病初期
りんどう	黒腐病	4000						
チューリップ	皮膚病 葉腐病	100~200	—	植付前	1回	15分間球根浸漬	1回	