キャプレート水和剤

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数
（倍）</th><th>使用液量
（L/10a）</th><th>使用時期</th><th>本剤の
使用回数</th><th>使用
方法</th><th>キャプタンを
含む農薬の
総使用回数</th><th>ベノミル系を含
む農薬の総使
用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">なし</td><td>輪紋病</td><td>500～600</td><td rowspan="3">200～700</td><td rowspan="2">収穫7日前ま
で</td><td rowspan="2">4回以内</td><td rowspan="8">散布</td><td rowspan="2">9回以内</td><td rowspan="2">6回以内（塗布は
2回以内、散布
は4回以内）</td></tr>
<tr><td>黒星病</td><td rowspan="4">600～800</td></tr>
<tr><td>おうとう</td><td>灰星病
炭疽病</td><td>収穫14日前
まで</td><td>2回以内</td><td>5回以内</td><td>2回以内</td></tr>
<tr><td rowspan="2">きゅうり</td><td>炭疽病</td><td rowspan="5">100～300</td><td rowspan="2">収穫前日ま
で</td><td rowspan="2">3回以内</td><td rowspan="5">5回以内（種
子粉衣は1回
以内</td><td rowspan="2">4回以内（種子へ
の処理は1回以
内、は種後は3
回以内）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">灰色かび病</td><td rowspan="3">500～600</td></tr>
<tr><td>なす</td><td>収穫開始3日
前から</td><td>1回</td><td>4回以内（種子粉
衣は1回以内、
は種後は3回以
内）</td></tr>
<tr><td>トマト</td><td>灰色かび病
葉かび病</td><td>600</td><td>収穫前日ま
で</td><td>3回以内</td><td>6回以内（種子へ
の処理は1回以
内、灌注は2回
以内、散布及び
常温煙霧は合計
5回以内）</td></tr>
</table>