

# タチガレファイト液剤

作物名	適用病害虫名/使用目的	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ヒドロキシイソキサ ゾールを含む農薬 の総使用回数
稲(箱育苗)	根の生育促進 移植時の発根及び活着促進	500~600	育苗箱(30X60X3cm、使用土壌5L)1箱 当り500~1000ml	は種時及び発 芽後	2回以内	土壌灌注	3回以内 (移植前の土壌混 和は1回以内、移植 前の土壌灌注及び 灌注は2回以内)
		300	育苗箱(30X60X3cm、使用土壌5L)1箱 当り500ml				
	苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(ピシウム菌) ムレ苗防止	250~300	育苗箱(30X60X3cm、使用土壌5L)1箱 当り500ml				
		500~600	育苗箱(30X60X3cm、使用土壌5L)1箱 当り500~1000ml				
	ごま葉枯病	250	育苗箱(30X60X3cm、使用土壌5L)1箱 当り500ml	は種時	1回		
キャベツ	ピシウム腐敗病	1000	セル形成育苗トレイ 1箱またはペーパー ポット1冊(30X60cm、 使用土壌3.0~4.0L) 当り0.5L	出芽時~育苗 期	3回以内	3回以内	
きゅうり	苗立枯病(ピシウム菌)	500	3L/㎡	は種直後	1回	全面土壌 灌注	2回以内 (育苗土壌への混 和は1回以内、苗床 への灌注は1回以 内)
メロン				は種時			
すいか	苗立枯病			は種直後			
オクラ	苗立枯病(ピシウム菌)	300~1000	50ml/株	は種時~発芽 初期	2回以内	植穴又は 株元灌注	2回以内
てんさい	苗立枯病	500	ペーパーポット1冊 当り1L	は種時~生育 初期 但し、収 穫120日前まで	3回以内	灌注	5回以内 (種子粉衣は1回以 内、育苗土壌への 混和は1回以内、灌 注は3回以内)
			3L/㎡				