テーク水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量（L/10a）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シメコナゾールを含む農薬の総使用回数	マンゼブを含む農薬の総使用回数
りんご	うどんこ病 モニリア病 すす点病 すす斑病 褐斑病 黒星病 赤星病 斑点落葉病 黒点病	600～800	200～700	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
なし	褐色斑点病	600						5回以内
かき	うどんこ病 落葉病 炭疽病			収穫45日前まで	2回以内		2回以内	2回以内
みかん	そうか病 黒点病 灰色かび病	500～600		収穫30日前まで	3回以内		3回以内	4回以内
かんきつ（みかんを除く）		600		収穫90日前まで				
ぶどう	べと病 黒とう病 晩腐病 うどんこ病 灰色かび病	1000		収穫45日前まで	2回以内		2回以内	2回以内
すいか	炭疽病 うどんこ病 つる枯病	600～800	100～300	収穫7日前まで	5回以内		5回以内	7回以内
メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病							5回以内
かぼちゃ	べと病 うどんこ病 疫病			収穫21日前まで	2回以内		2回以内	2回以内
きゅうり	べと病 うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 褐斑病			収穫前日まで	3回以内		3回以内	3回以内
トマト	疫病 葉かび病 うどんこ病	800			2回以内		2回以内	2回以内
ねぎ	さび病 べと病 黒斑病 葉枯病	600		収穫14日前まで	3回以内		3回以内（は種時は1回以内）	3回以内
にんにく	さび病 葉枯病 白斑葉枯病	600～800		収穫7日前まで			6回以内（植付前は1回以内、植付後の株元散布は2回以内、散布は3回以内）	5回以内