

サンバード粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピラゾレートを含む農薬の総使用回数
移殖 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ヒルムシロ	移殖直後～ノビエ1葉期、ただし、移植後30日まで(近畿・中国・四国、九州では、移植直後～ノビエ1.5葉期、ただし、移植後30日まで)	壤土 ～ 埴土	3～ 4kg/10a	2回以内	湛水散布	北海道	2回以内
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ ヘラオモダカ(東北、北陸) オモダカ(東北、関東・東山・東海)		全域(北海道を除く)の普通期及び早期栽培地帯					
直播 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ	は種時	砂壤土 ～ 埴土	3kg/10a	1回	は種同時散布機で施用	全域	2回以内
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ			1.5kg/10a(少量散布)			全域(北海道を除く)	
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ	は種直後～ノビエ1葉期、ただし、収穫90日前まで(近畿・中国・四国、九州(壤土～埴土)では、は種直後～ノビエ1.5葉期、ただし、収穫90日前まで)		3kg/10a	2回以内	湛水散布または無人ヘリコプターによる散布	全域	
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ	は種直後～ノビエ1葉期、ただし収穫90日前まで		1.5kg/10a(少量散布)		湛水散布	全域(北海道を除く)	