エンペラー１キロ粒剤

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用雑草名</th><th>使用時期</th><th>10a当り
使用量</th><th>本剤の
使用回数</th><th>使用方法</th><th>ピラクロニルを含む農薬の総使用回数</th><th>ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数</th><th>フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">移植水稲</td><td rowspan="2">一年生雑草
マツバイ
ホタルイ
ウリカワ
ミズガヤツリ
ヘラオモダカ
ヒルムシロ
セリ
オモダカ
クログワイ
コウキヤガラ
アオミドロ・藻類による表層はく離</td><td>移植時</td><td rowspan="3">1kg</td><td rowspan="3">1回</td><td>田植同時
散布機で
施用</td><td rowspan="3">2回以内</td><td rowspan="3">2回以内</td><td rowspan="3">2回以内</td></tr>
<tr><td>移植直後～ノビエ3葉期　ただし、収穫60日前まで</td><td rowspan="2">湛水
散布</td></tr>
<tr><td>直播水稲</td><td>一年生雑草
マツバイ
ホタルイ
ウリカワ
ミズガヤツリ
ヘラオモダカ
ヒルムシロ
セリ</td><td>稲出芽揃期～ノビエ3葉期　ただし、収穫60日前まで</td></tr>
</table>