ガツント Z200FG

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用雑草名</th><th>使用時期</th><th>使用量
/10a</th><th>本剤の
使用回数</th><th>使用方法</th><th>テフリルトリオンを
含む農薬の
総使用回数</th><th>プロピリスルフロンを
含む農薬の
総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">移植水稲</td><td rowspan="2">一年生雑草
及び
マツバイ
ホタルイ
ヘラオモダカ
ウリカワ
ミズガヤツリ
ヒルムシロ
セリ
オモダカ
クログワイ
コウキヤガラ
アオミドロ･藻類に
よる
表層はく離</td><td>移植時</td><td rowspan="4">1kg</td><td rowspan="4">1回</td><td>田植同時散布機
で施用</td><td rowspan="4">2回</td><td rowspan="4">2回</td></tr>
<tr><td>植直後～
ノビエ3葉期
但し、
移植後30日まで</td><td rowspan="2">湛水散布
又は
無人航空機
散布</td></tr>
<tr><td>直播水稲</td><td>一年生雑草
及び
マツバイ
ホタルイ
ウリカワ
ミズガヤツリ
ヒルムシロ
セリ</td><td>稲1葉期～
ノビエ3葉期
但し、
収穫60日前まで</td></tr>
</table>