

アドマイヤー顆粒水和剤														
作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10a当りの 使用液量 (L)	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	イミダクロプリド を含む農薬の 総使用回数							
稲(箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	250~500	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り0.5L	移植2日前~ 移植当日	1回	灌注	3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田での散布は 2回以内)							
	イネミズウムシ イネドロオウムシ	250~1000												
小麦	アブラムシ類	15000	60~150	収穫14日前まで	2回以内	3回以内 (種子粉衣は1回以内、 散布は2回以内)	3回以内 (種子粉衣は1回以内、 散布は2回以内)							
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ ケシキスイ類 ゴマダラカミキリ成虫 コアオハナムグリ コナカイガラムシ類 アカマルカイガラムシ コナジラミ類 アザミウマ類 カメムシ類	5000~10000	200~700	収穫14日前まで (ただし、露地栽培につ いては発芽期から開 花期を除く)	3回以内		3回以内	3回以内						
	りんご	アブラムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ カメムシ類 リンゴワタムシ						5000~15000 5000~10000 5000	収穫3日前まで (ただし、露地栽培につ いては発芽期から開 花期を除く)	2回以内	2回以内			
うめ すもも	アブラムシ類	10000		収穫21日前まで (ただし、露地栽培につ いては発芽期から開 花期を除く)	2回以内			2回以内						
なし	コナカイガラムシ類	5000		収穫3日前まで (ただし、露地栽培につ いては発芽期から開 花期を除く)					2回以内	2回以内				
	アブラムシ類 カメムシ類	5000~10000		収穫14日前まで (ただし、露地栽培につ いては発芽期から開 花期を除く)										
ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類	5000~10000		収穫21日前まで (ただし、露地栽培につ いては発芽期から開 花期を除く)	3回以内				3回以内			3回以内		
	ぶどう	コナカイガラムシ類 フタテンヒメヨコバイ アザミウマ類		5000 5000~10000								収穫7日前まで (ただし、露地栽培につ いては発芽期から開 花期を除く)	2回以内	2回以内
かき	アブラムシ類 アザミウマ類 カメムシ類	5000 5000~10000		収穫14日前まで	3回以内							2回以内		
	マンゴー パッションフルーツ アテモヤ	アザミウマ類 コナカイガラムシ類		10000									収穫7日前まで	
なす	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	5000~10000		収穫前日まで	2回以内	3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計2回以内)							3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計2回以内)	
ピーマン(施設栽培)	アブラムシ類 アザミウマ類	5000~10000	収穫前日まで	2回以内			3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計3回以内)							
とうがらし類			収穫前日まで (ただし、露地栽培につ いては開花期終了後)								2回以内		3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計3回以内)	
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	100~300	収穫前日まで					3回以内						
きゅうり(施設栽培)	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	5000~10000	収穫3日前まで (ただし、露地栽培につ いては着果後)		3回以内					3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計3回以内)				
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	5000~10000	収穫前日まで	2回以内				2回以内						
メロン	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類	10000	収穫7日前まで		2回以内				2回以内					
にがうり(施設栽培)	アブラムシ類	80 160 400 2500 5000~15000	1.6 1.6~3.2 3.2~10 25 100~300	収穫14日前まで							2回以内			3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計3回以内)
なバナ類	アブラムシ類	80 160 400 2500 5000~15000	1.6 1.6~3.2 3.2~10 25 100~300	収穫14日前まで	2回以内							3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計3回以内)		
ばれいしょ	アブラムシ類 オオニジュウヤホシテントウ	80	1.6	収穫14日前まで							2回以内			
		160	1.6~3.2											
		400	3.2~10											
		2500	25											
てんさい	カメノハマシ アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ	300	ペーパーポット 1冊当り1L (3L/m ²)	定植時	1回	灌注	3回以内 (種子への処理 又は灌注は1回以内、 散布は2回以内)							
	テンサイトビハムシ	300~500				散布	3回以内 (種子への処理 又は灌注は1回以内、 散布は2回以内)							
	アブラムシ類	5000~15000	100~300	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内 (種子への処理 又は灌注は1回以内、 散布は2回以内)							
みょうが(花穂)	カイガラムシ類	10000	100~300	収穫前日まで	2回以内	散布、 但し花穂の 発生期には マルチフィルム 被覆により 散布液が 直接花穂に 飛散しない 状態で使用する	2回以内							
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない 場合にあつては開花期 終了まで			3回以内 (定植時の 土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)							
かぼちゃ				アブラムシ類			3回以内 (定植時の 土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)							
アスパラガス				アザミウマ類			2回以内							
こんにゃく				アブラムシ類			3回以内 (培土時の 土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)							
食用ゆり				アブラムシ類			3回以内							
すいぜんじな				アブラムシ類			2回以内							
さといも(葉柄)				アブラムシ類			10000	100~300	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計3回以内)		
							10000	100~300						
							80	1.6~2						
	200	2~4												
さといも	アブラムシ類	10000	100~300	収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計3回以内)							
		80	1.6~2											
		200	2~4											
		400	4~10											
かんしょ	アブラムシ類	10000	100~300	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(植付前までの 土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)							
にんじん				収穫3日前まで				2回以内						
みしまさいこ				収穫30日前まで				3回以内						
豆類 (未成熟、ただし、 未成熟そらまめ除く)	アブラムシ類	1000	100~300	収穫前日まで (ただし、露地栽培につ いては開花期終了後)	2回以内	散布	3回以内 (定植時及び は種時の土壌混和は 合計1回以内、散布は2回以内)							
未成熟そらまめ				収穫7日前まで (ただし、露地栽培につ いては開花期終了後)				3回以内 (定植時及び は種時の土壌混和は 合計1回以内)						
やまのいも				160				3.2~4.0	収穫14日前まで	2回以内	3回以内 (育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布及び常温 煙霧は合計3回以内)			
				400				4.0~12	収穫14日前まで					
はくさい	アブラムシ類	10000	100~300	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は2回以内)							
キャベツ				収穫3日前まで			3回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は2回以内)							
レタス				収穫14日前まで			3回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の処理は2回以内)							
ほうれんそう				収穫前日まで			3回以内 (は種時の土壌混和は1回以 内、散布は2回以内)							
かぶ	アブラムシ類	5000	100~300	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以 内、散布は2回以内)							
ねぎ				収穫14日前まで				3回以内 (定植時までの処理は1 回以内、 散布は2回以内)						
たまねぎ	アザミウマ類	5000	セル成型育苗 トレイ1箱又は ペーパーポット 1冊(30× 60cm、使用土 壌約1.5~4L) 当り0.5L	定植前日~定植時	1回	灌注	2回以内 (定植時までの処理は1 回以内)							
	ネギハモグリバエ	500												
みつば	アブラムシ類	10000	100~300	収穫7日前まで ただし、伏せ込み 栽培は伏せ込み 前まで	2回以内	散布	2回以内							
さく(施設栽培)	アザミウマ類	10000	100~300	発生初期	5回以内		5回以内							
げっきつ	ミカンキジラミ	5000	200~700	発生(ただし、露地栽培 については発芽期から 開花期を除く)	4回以内		4回以内							