

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	散布量 (L/10a)	使用時期	使用回数*	使用方法	
りんご	アブラムシ類 シンクイムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ オオタバコガ ハマキムシ類 カイガラムシ類	1000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布	
	ケムシ類	1000～1500					
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 カイガラムシ類	1000		収穫3日前まで			
もも	クビアカツヤカミキリ			成虫発生期但し、 [収穫14日前まで			
	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類			収穫14日前まで	5回以内		
ネクタリン	クビアカツヤカミキリ			成虫発生期但し、 収穫21日前まで			2回以内
	アブラムシ類 ケムシ類			収穫7日前まで	3回以内		
小粒核果類 (うめを除く)	クビアカツヤカミキリ			成虫発生期但し、 収穫7日前まで			
	びわ			アブラムシ類 ビワキジラミ	収穫7日前まで		5回以内
うめ	アブラムシ類 ケムシ類 ノコメガリキリガ			クビアカツヤカミキリ	成虫発生期但し、 収穫7日前まで		3回以内
	かんきつ		アブラムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ゴマダラカミキリ ハマキムシ類 アゲハ類 ヨモギエダシャク カネタタキ ミカンバエ成虫 クワノミハムシ			収穫14日前まで	3回以内
かき	アザミウマ類 イラガ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ カキノヒメヨコバイ ケムシ類 ハマキムシ類		1000	収穫21日前まで	1回		
ぶどう	チャノコカクモンハマキ カイガラムシ類 ケムシ類	収穫45日前まで					
メロン	ウリノメイガ アブラムシ類	100～300		収穫前日まで	5回以内		
ばれいしょ	ワタアブラムシ		収穫7日前まで	4回以内			
かんしょ	イモコガ ナカジロシタバ ハスモンヨトウ						
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ アブラムシ類		発生初期	5回以内			
さくら	アブラムシ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ		成虫発生期				
	ケムシ類		200～700	クビアカツヤカミキリ			
てんさい	ヨトウムシ テンサイトビハムシ		1000～1500	100～300	収穫14日前まで	3回以内	
茶	チャノコカクモンハマキ		750	200～400	摘採14日前まで		