オルトラン粒剤

作物名	適用害虫名	使用量 (kg/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェート を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 ネキリムシ類	3～6 (1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は 1回以内、 定植後の散布は 1回以内)
	アザミウマ類	6(2g/株)				
	アブラムシ類	6g/㎡	育苗期		散布	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6 (1～2g/株)	定植時		作条散布 又は植穴処理	1回
	ネキリムシ類				植穴処理	
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ				作条散布 又は植穴処理	
	ネキリムシ類				植穴処理	
ピーマン	アブラムシ類	2g/株			株元散布	
はくさい	アオムシ コナガ ヨトウムシ ネキリムシ類	3～6 (1～2g/株)			植穴処理	
	アブラムシ類					
こまつな		6	は種前		播溝土壌混和	
ブロッコリー	ヨトウムシ アザミウマ類 ネキリムシ類 アオムシ	6 (2g/株)	定植時		株元散布	
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3～4	は種前		作条散布	
かぶ	ネキリムシ類	4	収穫21日前まで		株元散布	
	アブラムシ類					
オクラ		6 (2g/株)	収穫開始14日前まで			
ごぼう		3～6	収穫75日前まで			2回以内 (株元散布は1回以内、 散布は1回以内)
れんこん		4	収穫14日前まで	2回以内	散布 無人航空機による散布	2回以内
ばれいしょ		3～6 (1～2g/株)	植付時	1回	作条散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
えだまめ	ハスモンヨトウ	3～6	収穫21日前まで	3回以内	生育期株元散布	3回以内
なばな類	アブラムシ類	6	定植時 は種時	1回	植溝土壌混和 播溝土壌混和	1回
花き類・観葉植物 (きく、宿根スターチス、カーネーション、アリウム、たであいを除く)	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内
	ヨトウムシ類	6				
つつじ類	ツツジグンバイ	12				
	ケムシ類		生育期 (樹高2m以下)			
とどまつ	アブラムシ類	5g/樹				
樹木類 (つつじ類、とどまつ、ポインセチアを除く)	ケムシ類	12				
宿根スターチス	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6	発生初期			
	ヨトウムシ類 コガネムシ類幼虫	6				
カーネーション	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6				
	コナガ ヨトウムシ類	6				
アリウム	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6				
	ネギコガ ヨトウムシ類	6				
きく	ネキリムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類					
	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6				
たであい	アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り50g	定植時	1回	本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。	1回
		6			株元散布	
いぐさ	イグサシンムシガ	4	生育期	2回以内	湛水散布	2回以内
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	10	発生初期	5回以内	全面散布	5回以内
	タマナヤガ	5～10				
たばこ	ヨトウムシ ネキリムシ アブラムシ類 アザミウマ類 ジャガイモガ ヤサイゾウムシ	3～6	移植前	1回	作条散布後 土壌混和	2回以内
	アブラムシ類		本畑初期		株元散布	