

オルトラン水和剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数		
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ フジコナカイガラムシ	1500	200～700L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内		
いちじく	アザミウマ類	2000					1回		
キャベツ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ タマナギンウワバ	1000～1500			1回		2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)		
	アオムシ コナガ アブラムシ類	1000～2000							
はくさい	カブラハバチ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500	100～300L/10a	収穫30日前まで	3回以内			1回	
	アオムシ コナガ アブラムシ類	1500～2000							
レタス 非結球レタス	ヨトウムシ	1000～1500			収穫14日前まで				3回以内
	アザミウマ類 アブラムシ類 オオタバコガ	1000							
カリフラワー	ヨトウムシ				収穫21日前まで				1回
非結球あぶらな科 葉菜類 (ケール、からしな、 ルッコラ、四川搾菜 (莖葉)、畑わさび、 畑わさび(葉)を除く)	アブラムシ類	1500			収穫21日前まで				1回
しょうが	アワノメイガ	1000	3.2	収穫45日前まで	2回以内				
		32							
ごぼう	アブラムシ類			収穫開始7日前まで	1回	2回以内 (株元散布は1回以内、散布は1回以内)			
オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリヨコバイ	1000	100～300L/10a	収穫開始7日前まで		1回			
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ			収穫30日前まで	2回以内	3回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)			
	アブラムシ類	300	25L/10a						
てんさい	ジャガイモガ	1000～1500	100～300L/10a	収穫45日前まで	3回以内		4回以内(育苗期の灌注は1回以内、散布は3回以内)		
	ヨトウムシ テンサイモグリハナバエ	1000							
	トビハムシ類	16	1.6L/10a	無人航空機による散布					
	ヨトウムシ	300	25L/10a		散布				
トビハムシ類	60～100	2.5～3L/㎡	育苗期	1回	灌注				
未成熟とうもろこし	アブラムシ類 アワノメイガ			収穫7日前まで	2回以内		2回以内		
あずき	アズキノメイガ アブラムシ類 ヨトウムシ	1000	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内		散布		
だいず	ハスモンヨトウ マメシンクイガ			収穫60日前まで					
	アブラムシ類	16	1.6L/10a	無人航空機による散布					
えだまめ	ハスモンヨトウ アブラムシ類	1000		収穫21日前まで	散布				
いんげんまめ	アブラムシ類 インゲンマメゾウムシ		100～300L/10a	収穫14日前まで					
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000～1500	25L/10a 1.6L/10a 25L/10a 1.6L/10a	収穫21日前まで	5回以内	無人航空機による散布			
	ネギハモグリバエ	1000							
	ネギアザミウマ	300							
	ネギハモグリバエ	300							
	ネギハモグリバエ	16							
にんにく	ネギコガ アブラムシ類 アザミウマ類	1000	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000	200～400L/10a	摘採45日前まで	1回	1回			
	チャノコカクモンハマキ	1000～1500							
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	1500	200～700L/10a	収穫14日前まで					
だいおう	ヨトウムシ	1000		生育期 但し、 収穫230日前まで	3回以内	3回以内			
みしまさいこ				収穫30日前まで					
薬用にんじん	アブラムシ類	1500		収穫180日前まで	5回以内	5回以内			
ソルガム		1000	100～300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	3回以内			
	ツマジロクサトウ								
もりあざみ	アブラムシ類	1500							
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類	1000		収穫45日前まで	1回	1回			
葉しょうが	アワノメイガ			収穫21日前まで					
たばこ	ヨトウムシ タバコアオムシ アブラムシ類	1500～2500	25～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布			
	ヤサイゾウムシ	1000～2000	1L/㎡	苗床期					
	ジャガイモガ若齢幼虫 ジャガイモガ中齢幼虫	1500～2000	25～180L/10a	収穫10日前まで					
つつじ類	ツツジゲンバイ	1500	200～700L/10a						
つばき類	チャドクガ								
さくら	モンクロシャチホコ	1000～1500							
	アメリカシロヒトリ	1500～2000							
花き類・観葉植物	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～1500							
	アオムシ ヨトウムシ類								
きく	マメハモグリバエ オオタバコガ			発生初期	5回以内				
ストック	コナガ ハイマダラノメイガ		100～300L/10a						
宿根アスター	ヨメナスジハモグリバエ								
オンシジウム	カイガラムシ類								
カーネーション	コナガ								
ひまわり	タバコガ								
斑入りアマドコロ リアトリス	ハマキムシ類	1000							
樹木類			200～700L/10a						
グラジオラス	アザミウマ類		—		植付時	1回	10分間球根浸漬		
芝	シバツトガ タマナヤガ		0.25～2L/㎡	発生初期	5回以内	散布			
	スジキリヨトウ ケラ		1～2L/㎡						
	シバオサゾウムシ成虫		2L/㎡						
	アカフツヅリガ		0.5～1L/㎡						
まめ科牧草	アブラムシ類		100～300L/10a	収穫45日前まで	3回以内	3回以内			