

スピノエースフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	使用方法	総使用回数 (*)						
稲(箱育苗)	イネミズゾウムシ幼虫	200	育苗箱(30X60 X3cm、使用土 壌約5L)1箱当 たり500mℓ	移植当日	灌注	1回						
	イネドロオイムシ			移植3日後～ 移植当日								
かんきつ	ミカンハモグリガ アザミウマ類 ナミアゲハ	4000～6000	200～700	収穫7日 前まで	散布	2回以内						
	ヨモギエダシャク	4000										
りんご	キンモンホソガ ハマキムシ類	2000～3000		200～700		収穫3日 前まで	散布	3回以内				
	モモシンクイガ	2000										
もも	シンクイムシ類	2000～4000							200～700	収穫3日 前まで	散布	3回以内
	ミカンキイロアザミウマ	4000～6000										
	モモハモグリガ	2000～6000										
	リンゴコカクモンハマキ	4000										
すもも	スモモヒメシンクイ											
ネクタリン	シンクイムシ類	2000				200～700		収穫3日 前まで				
	ミカンキイロアザミウマ	4000～6000										
	モモハモグリガ	2000～6000										
	リンゴコカクモンハマキ	4000										
さんしょう (果実)	アザミウマ類	5000	200～700	収穫3日 前まで	散布		1回					
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノキイロアザミウマ	2000～4000					200～400		摘採7日 前まで	2回以内		
	チャハマキ ヨモギエダシャク	4000										