スプラサイド水和剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DMTPを含む農薬の総使用回数
かんきつ（みかんを除く）	カイガラムシ類（ヤノネカイガラムシを除く） ヤノネカイガラムシ（幼虫～未成熟成虫） カメムシ類	1500倍	200～700 L/10a	収穫90日前まで	4回以内	散布	4回以内
みかん				収穫14日前まで			4回以内(50～100倍希釈散布は2回以内)
りんご	シンクイムシ類 カイガラムシ類	1500～2000倍		収穫30日前まで	2回以内		2回以内
	アブラムシ類 ハマキムシ類（コカクモンハマキを除く） ギンモンハモグリガ カメムシ類 リンゴワタムシ	1500倍					
なし（有袋栽培）	シンクイムシ類 アブラムシ類 カイガラムシ類	1500～2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
	ナシホソガ カメムシ類 ナシチビガ	1500倍					
なし（無袋栽培）	シンクイムシ類 アブラムシ類 カイガラムシ類	1500～2000倍		収穫21日前まで	2回以内		2回以内
	ナシホソガ カメムシ類 ナシチビガ	1500倍					
もも	シンクイムシ類 カイガラムシ類 モモハモグリガ	1500～2000倍					4回以内(200倍希釈散布は2回以内、1500～2000倍希釈散布は2回以内)
	クビアカツヤカミキリ	1500倍					
ネクタリン	シンクイムシ類 カイガラムシ類 モモハモグリガ	1500～2000倍		収穫14日前まで			3回以内（収穫後～発芽前は1回以内、発芽後は2回以内）
ぶどう	カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ	1500倍					2回以内(休眠期は1回以内)
	ブドウネアブラムシ	500倍	10L/㎡	収穫90日前まで		土壌灌注	
かき	カイガラムシ類、 カキクダアザミウマ、 カキノヒメヨコバイ、 カメムシ類	1500倍	200～700 L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
	チャノキイロアザミウマ	1000倍					
おうとう	カイガラムシ類、 カメムシ類、 ショウジョウバエ類	1500倍		収穫7日前まで			
キウイフルーツ	クワシロカイガラムシ			収穫60日前まで			
うめ	カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ			収穫14日前まで	2回以内		2回以内
すもも	シンクイムシ類 クビアカツヤカミキリ						
くるみ	ケムシ類	1000倍		収穫7日前まで			
なつめ	カイガラムシ類	2000倍		収穫14日前まで			
すいか	ミナミキイロアザミウマ	1000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	5回以内		5回以内
メロン				収穫3日前まで	2回以内		2回以内
ピーマン				収穫14日前まで	3回以内		3回以内
なす	ミナミキイロアザミウマ オンシツコナジラミ						
花き類・観葉植物	オンシツコナジラミ			発生初期	6回以内		6回以内