

テルスター水和剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	10a当り 散布液量 (L)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピフェントリンを 含む農薬の 総使用回数		
りんご	モモシンクイガ キンモンホソガ ギンモンハモグリガ リンゴハダニ ナミハダニ アブラムシ類 ハマキムシ類	1000	200～700	収穫前日まで	1回	散布	1回		
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ハダニ類 ナシチビガ	1000～2000			2回以内		2回以内		
	カメムシ類								
ぶどう	チャノキイロアザミウマ	1000		収穫14日前まで	1回		2回以内 (散布は1回以内、 くん煙は1回以内)		
もも	モモハモグリガ アブラムシ類 カメムシ類								
かき	チャノキイロアザミウマ カメムシ類	1000～2000							
	カキクダアザミウマ ハダニ類 カキノヒメヨコバイ	1000		1000～2000	収穫前日まで		2回以内		
びわ	アブラムシ類 オオタバコガ カメムシ類								
かんきつ	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類				収穫前日まで			3回以内	3回以内
	ワタミヒゲナガゾウムシ アブラムシ類								
あけび(果実)	アブラムシ類			収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
ハスカップ				収穫21日前まで	1回	1回			
ホップ	アズキノメイガ ハダニ類 アサトビハムシ			収穫30日前まで	2回以内	2回以内			
すいか	アブラムシ類 ハダニ類	1000	150～300	収穫前日まで	4回以内	4回以内			
メロン	アブラムシ類 ハダニ類 タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミ を含む)								
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ							3回以内	3回以内
なす	アブラムシ類 ハダニ類 オンシツコナジラミ								
キャベツ はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ	1000～1500		収穫21日前まで	4回以内	4回以内			
だいこん	アブラムシ類				2回以内	2回以内			
ばれいしょ			100～300	収穫3日前まで					
てんさい	ヨトウムシ	250	25	収穫7日前まで	4回以内	4回以内			
		1000～1500							
	カメノコハムシ	1500							
	ハダニ類								
いんげんまめ	インゲンマメゾウムシ	1000	100～300	収穫3日前まで	3回以内	3回以内			
だいず	アブラムシ類						収穫7日前まで		
パセリ				収穫3日前まで					
あずき	フキノメイガ	1500	150～300	収穫7日前まで					
ねぎ	シロイチモンジヨトウ								
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ ヨモギエダシャク	1000	200～400	摘採14日前まで	2回以内	2回以内			
たばこ	ヨトウムシ アブラムシ類 オンシツコナジラミ	1500	25～180	収穫10日前まで	2回以内	2回以内			
芝	スジキリヨトウ シバツトガ		300ml/m ²	発生初期					
ばら きく カーネーション	ハダニ類	1000	150～300	—	3回以内	3回以内			
樹木類	アメリカシロヒトリ	1000倍	200～700	発生初期	6回以内	6回以内			