ネマトリンエース粒剤

作物名	適用害虫名	使用量 (kg/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ホスチアゼートを含む 農薬の総使用回数
いちじく	ネコブセンチュウ	20	収穫60日前まで	1回	樹冠下処理	1回
かんしょ		15～20	植付前		作条土壌混和	2回以内 (苗床は1回以内、 本圃は1回以内)
		10～30	苗床植付前		全面土壌混和	
	ネグサレセンチュウ	20～30	植付前			
ばれいしょ	アブラムシ類 ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	20～25				1回
	ジャガイモシストセンチュウ ジャガイモシロシストセンチュウ	20				
やまのいも やまのいも（むかご） 葉しょうが	ネコブセンチュウ					
ブロッコリー カリフラワー	テンサイシストセンチュウ		収穫7日前まで			
さといも	ネグサレセンチュウ	25	植付前			
こんにゃく	ネコブセンチュウ					
オクラ みつば	ネコブセンチュウ	20	は種前			
とうがん しろうり			定植前但し、 収穫45日前まで			
ズッキーニ(花)			定植前但し、 収穫21日前まで			
ズッキーニ かぼちゃ			定植前			
パセリ さやえんどう						
きゅうり にがうり		15～20	は種前又は定植前			
すいか メロン トマト ミニトマト ピーマン		15～20	定植前			2回以内(定植前の 土壌混和は1回以内、 土壌灌注は1回以内)
なす						1回
	ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ オンシツコナジラミ	20				
いちご	ハダニ類	25				
	ネグサレセンチュウ	20～25				
だいこん		15～25	は種前			
	ネコブセンチュウ	15～20				
にんじん	ネグサレセンチュウ	20	は種前			
	ネコブセンチュウ	15～20				
ごぼう	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20			は種溝土壌混和	
らっきょう	ネダニ ネグサレセンチュウ	15	植付前		植溝土壌混和	
にんにく	イモグサレセンチュウ	25			全面土壌混和	3回以内(植付前の 土壌混和は1回以内、 球根浸漬は1回以内、 土壌灌注は1回以内)
しょうが	ネコブセンチュウ	20				2回以内(植付前の 土壌混和は1回以内、 土壌灌注は1回以内)
しょうが						1回
みょうが(花穂) みょうが(茎葉)			定植前			2回以内 (種根茎浸漬は1回以内、 定植前の土壌混和は 1回以内)
あずき	ダイズシストセンチュウ		は種前			1回
ガーベラ	ネコブセンチュウ		植付前			
カーネーション	クローバーシストセンチュウ					
すずらん	ネグサレセンチュウ	25				
きく		20～25	定植前			2回以内
	ナミハダニ	20				
ぼたん	ネコブセンチュウ					3回以内(定植前の 土壌混和は1回以内、 生育期の根鉢浸漬は 1回以内、土壌灌注は 1回以内)
つつじ類	イシュクセンチュウ					1回