

パダンSG水溶剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (使用量)	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	カルタップを含む 農薬の総使用回数	
稲	ニカメイチュウ コブノメイガ イネツトムシ	1500倍	60～150L /10a	収穫21日前まで	6回以内	散布	6回以内 (浸漬前は1回以 内、浸漬後から直 播では種時又は 移植時までの処理 は1回以内)	
	イネハモグリバエ	1500～3000倍						
	イネシガラセンチュウ		—	浸種前	1回	24時間 種もみ浸漬		
はとむぎ	アワノメイガ	1500倍	60～150L /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
とうもろこし 飼料用とうもろこし		1000倍	100～300L /10a	収穫21日前まで				
かき	チャノキイロアザミウマ カキホソガ イラガ カキノキマダラメイガ	1500倍		200～700L /10a	収穫45日前まで	4回以内	散布	4回以内
	カキノヘタムシガ	1500～3000倍	裂果前		3回以内	3回以内		
くり	モモノゴマダラノメイガ ネスジキノカワガ	1500倍	春芽伸長初期 但 し収穫90日前まで		4回以内	4回以内		
びわ びわ(葉)	ナシヒメシンクイ		収穫21日前まで		5回以内	5回以内		
大粒種ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ スカシバ類		収穫30日前まで		3回以内	3回以内		
キウイフルーツ	キイロマイコガ キウイヒメヨコバイ		収穫14日前まで		4回以内	4回以内		
キャベツ	アオムシ アブラムシ類 コナガ ナメクジ類 ハイマダラノメイガ	1500倍	100～300L /10a		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
はくさい	コナガ アオムシ アブラムシ類 カブラハバチ類 ナメクジ類				収穫7日前まで	3回以内		3回以内
だいこん	アブラムシ類 カブラハバチ類 ハモグリバエ類 アオムシ キスジノミハムシ コナガ ダイコンハムシ				4回以内	4回以内		
なばな	アブラムシ類				1回	1回		
ブロッコリー	コナガ			3回以内	3回以内			
はつかだいこん	コナガ			3回以内	3回以内			
チンゲンサイ	ハモグリバエ類 コナガ キスジノミハムシ			3回以内	3回以内			
さやえんどう 実えんどう	ウラナミシジミ ナモグリバエ			1500～3000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
さやいんげん	マメハモグリバエ			1500倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
ほうれんそう	ミナミキイロアザミウマ アシグロハモグリバエ シロオビノメイガ				2回以内	2回以内		
レタス	ハモグリバエ類 ナメクジ類 アブラムシ類	3回以内	3回以内					
非結球レタス		2回以内	2回以内					
たまねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	3回以内	3回以内					
ねぎ	アザミウマ類 クロバネキノコバエ類 ハモグリバエ類	2回以内	2回以内					
ばれいしょ	ジャガイモガ若齢幼虫	6回以内	7回以内(種いも粉 衣は1回以内、散布 は6回以内)					
さといも	ネグサレセンチュウ	300倍	—		植付前	1回	30分間 種いも浸漬	1回
しょうが	アズキノメイガ アワノメイガ	1500倍	100～300L /10a		収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
くわい	ハスモンヨトウ				3回以内	3回以内		
ふき	フキノメイガ			2回以内	2回以内			
ふき(ふきのとう)	アブラムシ類 アザミウマ類			2回以内	2回以内			
しそ	アザミウマ類			3000倍	2回以内			
ホップ	アズキノメイガ アサノミハムシ	1500倍	200～700L /10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
茶	チャノホソガ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ			200～400L /10a	摘採10日前まで	1回	1回	
てんさい	シロオビノメイガ			4回以内	4回以内			
いぐさ	イグサシンムシガ			3回以内	3回以内			
ガーベラ	マメハモグリバエ			4回以内	4回以内			
シクラメン	ミカンキイロアザミウマ			5回以内	5回以内			
樹木類	シャクトリムシ類			1500～3000倍	200～700L /10a	発生初期	3回以内	3回以内