

ファルコンフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	メキシフェノジドを 含む農薬の 総使用回数	
りんご	ハマキムシ類	4000～6000	200～700	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	キンモンホソガ	2000						
	ケムシ類 ヨモギエダシャク	6000						
もも おうとう	ハマキムシ類		収穫3日前まで					
なし	ケムシ類 ハマキムシ類	4000	150～300	収穫前日まで	2回以内		2回以内	
はくさい	ヨトウムシ アオムシ			収穫3日前まで	3回以内		3回以内	
だいこん	コナガ	1000	100～300	収穫7日前まで	2回以内		2回以内	
キャベツ		アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ タマナギンウワバ	2000～4000					150～300
		オオタバコガ	2000					
		ハイマダラノメイガ	4000					
ブロッコリー	ハスモンヨトウ ヨトウムシ	収穫3日前まで						
はなっこりー	ハスモンヨトウ	4000	150～180	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
つるな				収穫3日前まで				
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000～4000	100～300	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
ピーマン なす トマト	オオタバコガ				2回以内	2回以内		
ししとう	ハスモンヨトウ	4000	2000	100～150	3回以内	3回以内		
	オオタバコガ	2000						
はすいも(葉柄)	ハスモンヨトウ	4000～6000	100～300	収穫3日前まで	3回以内	3回以内		
かんしょ	ナカジロシタバ							
ふき	ハスモンヨトウ	4000	2000～4000	150～300	2回以内	2回以内		
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ	100～300						
非結球レタス	ハスモンヨトウ	4000	200	収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
食用ぎく			150～200	収穫3日前まで				
食用金魚草	シロイチモジヨトウ	4000	100～300	150～200	2回以内	2回以内		
食用なでしこ			100～300					
ねぎ	ヨトウムシ	4000～6000	100～150	収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
茶	チャハマキ	4000	200～400	摘採7日前まで	2回以内	2回以内		
	チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシャク チャノホソガ	4000～ 8000						
	ハスモンヨトウ	8000						