ベストガード水溶剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
もも りんご	アブラムシ類	1000～2000倍	200～700L/10a		3回以内		3回以内
なし	アブラムシ類 チュウゴクナシキジラミ カメムシ類 アザミウマ類						
ぶどう	コナカイガラムシ類 アザミウマ類			収穫30日前まで			
	フタテンヒメヨコバイ	1000倍					
かき	チャノキイロアザミウマ			収穫7日前まで			
かんきつ	アザミウマ類 アブラムシ類	1000～2000倍					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	1000倍			2回以内		2回以内
ばれいしょ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	4回以内		5回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後は4回以内)
かんしょ	コナジラミ類	1000倍		育苗期			3回以内
	アブラムシ類	1000～2000倍					
メロン すいか	コナジラミ類 アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ			収穫7日前まで			4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内)
きゅうり	コナジラミ類 アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ クロバネキノコバエ類						
カリフラワー ブロッコリー	アブラムシ類 アザミウマ類	2000倍					5回以内(育苗期の散布は1回以内、定植時は1回以内、定植後は3回以内)
とうがらし類	コナジラミ類	1000～2000倍					
ピーマン	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ コナジラミ類	1000～2000倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内)
なす	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ コナジラミ類 カメムシ類						
トマト ミニトマト	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 クロバネキノコバエ類		100～300L/10a				
いちご	アブラムシ類 チビクロバネキノコバエ コナジラミ類	2000倍					4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、株元散布及び散布は合計3回以内)
レタス	アブラムシ類			収穫3日前まで			4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後3回以内)
だいこん		1000～2000倍		収穫7日前まで			3回以内
モロヘイヤ	コナジラミ類	2000倍					
アスパラガス		1000倍		収穫前日まで			
ねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ クロバネキノコバエ類	1000～2000倍					4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後3回以内)
たまねぎ	ネギアザミウマア	1000倍			2回以内		2回以内
せり(水田)	アブラムシ類	2000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
せり(水耕栽培) (ガラス室等の施設)							
食用べにばな (花)	ナモグリバエ			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
食用ぎく	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	1000倍					4回以内 (株元散布は2回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類	1000～2000倍					
茶	キャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで			2回以内
花き類･観葉植物(きく、ばらを除く)	コナジラミ類	1000倍	100～300L/10a	発生初期	4回以内		4回以内
	アブラムシ類	1000～2000倍					
ポインセチア	コナジラミ類 チビクロバネキノコバエ						
ばら きく	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマアブラムシ類	1000倍					
		1000～2000倍					
たばこ	アブラムシ類 タバコノミハムシ	2000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで	1回		1回