

マブリック水和剤20

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	使用方法	本剤及びフルバリネットを含む農薬の総使用回数		
りんご	キンモンホソガ シンクイムシ類 アブラムシ類 リンゴハダニ ナミハダニ ヒメシロモンドクガ ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ モモチョッキリゾウムシ	2000		収穫30日前まで				
	シンクイムシ類 ナシチビガ ハダニ類 ナシホソガ カメムシ類 ナシグンバイ ハマキムシ類 ニセナシサビダニ							
なし	アブラムシ類	2000～4000						
	アブラムシ類	2000～4000						
かんきつ (みかんを除く)	コアオハナムグリ ケンキスイ類 ケムシ類	2000		収穫45日前まで				
	カメムシ類 アブラムシ類 ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ	2000～4000						
みかん	コアオハナムグリ ケンキスイ類 ケムシ類	2000	200～700	収穫21日前まで	散布			
	カメムシ類 アブラムシ類 ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ	2000～4000						
かき	カキノヘタムシガ	2000		収穫30日前まで				
	カメムシ類 イラガ類 チャノキイロアザミウマ	2000～4000						
	ミノガ類	4000						
もも	モモハモグリガ シンクイムシ類 ハダニ類	2000		収穫21日前まで				
	アブラムシ類	2000～4000						
うめ	アブラムシ類 ケムシ類 モモヒメヨコバイ	4000						
おうとう	オウトウハマダラミバエ			収穫45日前まで				
びわ	アブラムシ類			収穫14日前まで				
キウイフルーツ	キイロマイコガ							
くり	クリタマバチ クリイガアブラムシ	2000		収穫7日前まで				
	クリシギゾウムシ						40	2～4
							20	2
すいか	ハダニ類	2000		収穫3日前まで				
メロン	アブラムシ類	4000						
はくさい	アオムシ コナガ ヨトウムシ タマナギンウワバ	1000～2000		収穫21日前まで				
	アブラムシ類	2000～4000						
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ	1000～2000		収穫14日前まで		3回以内		
	アブラムシ類	2000～4000						
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000	100～300					
	アブラムシ類	2000～4000						
なす	ハダニ類 アブラムシ類 オンシツコナジラミ	4000		収穫前日まで				
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ							
いちご	アブラムシ類	8000		収穫21日前まで				
かぼちゃ		4000					収穫7日前まで	
レタス							収穫21日前まで	
非結球レタス							収穫7日前まで	
たまねぎ	ネギアザミウマ	2000～4000		収穫7日前まで				
さやえんどう	ヒラズハナアザミウマ	4000		収穫前日まで		3回以内		
やまのいも	アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ	2000～4000		収穫7日前まで				
茶	チャノコカクモンハマキ カンザワハダニ	1000～2000	200～400	摘採21日前まで				
	チャノホソガ ツマグロアオカスミカメ	2000						
	ヨモギエダシヤク チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000～4000						
	コミカンアブラムシ	4000						
にんにく	ネギコガ アブラムシ類	2000		収穫3日前まで		2回以内		
ばれいしょ	アブラムシ類	4000		収穫7日前まで				
ばら	アブラムシ類	2000～4000	100～300					
		ハダニ類					2000	
きく	アブラムシ類	2000～4000						
ストック	コナガ							
カーネーション	ハダニ類 ヨトウムシ							
さくら	アメリカシロヒトリ	2000						
つばき類	チャドクガ		200～700		発生初期			
宿根かすみそう	ハダニ類		100～300					
トルコギキョウ	アザミウマ類	4000						