

ダブルストッパー

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
かぶ だいこん	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 萎黄病	30L/10a (1穴当り 3ml)	作付の10～ 15日前	1回	土壌くん蒸 (30×30cm ごとの 深さ15cm の穴に 1穴処理する。)	1回	1回
こまつな						2回以内 (床土1回以内)	
セルリー						3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)	
かんしょ	つる割病					1回	
	立枯病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
オクラ							
なす	半身萎凋病 青枯病 半枯病					2回以内 (床土1回以内)	
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)	
トマト ミニトマト	萎凋病 根腐萎凋病						
	ピーマン						
とうがらし類 ねぎ	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 萎凋病					2回以内 (床土1回以内)	
ほうれんそう							
いちご	炭疽病 萎黄病					3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)	
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
きゅうり すいか	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					2回以内 (床土1回以内)	
にがうり	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ つる割病						
にんじん	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ しみ腐病 萎凋病 黒しみ病					1回	
メロン	つる割病 黒点根腐病 えそ斑点病					2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)	
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	2回以内 (床土1回以内)					
しょうが	立枯病 根茎腐敗病						
みょうが(花穂) みょうが(茎葉)	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	1回					
かぼちゃ はくさい							
レタス 非結球レタス	根腐病						
ばれいしょ	そうか病 萎凋病	1回					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
やまのいも	褐色腐敗病	2回以内 (床土1回以内)					
ごぼう	黒あざ病 萎凋病						
		ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ					
こんにやく さといも	乾腐病	1回					
きく	半身萎凋病 萎凋病	3回以内 (床土1回以内、 圃場2回以内)					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	萎黄病(フザリウム菌) 萎凋病(フザリウム菌) 株枯病(フザリウム菌) 乾腐病(フザリウム菌) 球根腐敗病(フザリウム菌) 立枯病(フザリウム菌) 葉枯病(フザリウム菌) 腐敗病(フザリウム菌)						