ウララ DF

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量（L/10a）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロニカミドを含む農薬の総使用回数
りんご	リンゴワタムシ	2000	200～700	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類	2000～4000					
なし							
	チャノキイロアザミウマ	2000					
かき							
もも	アブラムシ類	2000～4000					
ネクタリン 小粒核果類				収穫7日前まで			
ぶどう	チャノキイロアザミウマ	1000		開花前まで			
	ツマグロアオカスミカメ	2000					
おうとう	チャノキイロアザミウマ コアオカスミカメ	2000		収穫前日まで			
小麦	アブラムシ類	4000	60～150	収穫7日前まで			
いちご		2000～4000	100～300	収穫前日まで	3回以内		3回以内
	コナジラミ類	2000					
きゅうり	コナジラミ類	2000					
	アブラムシ類	2000～4000					
なす トマト ミニトマト	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	2000					
ピーマン すいか	アブラムシ類	2000～4000			2回以内		2回以内
かぼちゃ				収穫7日前まで			
うり類（漬物用）			100～300	収穫前日まで			
にがうり							
アスパラガス		2000			3回以内		3回以内
	ネギアザミウマ						
レタス 非結球レタス	アブラムシ類				2回以内		2回以内
パセリ							
メロン		2000～4000		収穫前日まで			
	コナジラミ類	2000					
ばれいしょ	アブラムシ類	2000～4000		収穫前日まで	2回以内		2回以内
		500	25				
		1000					
さといも やまのいも やまのいも（むかご）		2000	100～300	収穫7日前まで			
えだまめ いんげんまめ だいず あずき		2000～4000		収穫前日まで			
さやえんどう さやいんげん 実えんどう							
たまねぎ	ネギアザミウマ	2000		収穫7日前まで			
ねぎ		1000～2000		収穫前日まで	3回以内		3回以内
くわい	アブラムシ類	2000		収穫21日前まで			
非結球あぶらな科 葉菜類		4000		収穫前日まで	2回以内		2回以内
すいぜんじな				収穫7日前まで			
キャベツ はくさい ブロッコリー		2000～3000		収穫前日まで			
だいこん		2000					
カリフラワー		2000		収穫14日前まで			
ごぼう		2000～4000		収穫7日前まで			
エンダイブ		4000		収穫前日まで			
セルリー							
ほうれんそう なばな類							
しゅんぎく							
未成熟とうもろこし		2000～4000		収穫3日前まで			
ズッキーニ							
オクラ		2000					
みつば		2000～4000		収穫3日前まで 但し、 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで			
しそ		4000		収穫3日前まで			
てんさい		2000～4000		収穫14日前まで			
食用ぎく		4000		収穫7日前まで			
食用ミニバラ		2000		収穫3日前まで			
きく（葉）		4000		収穫14日前まで			
おかひじき				収穫3日前まで			
茶	チャトゲコナジラミ	1000	200～400	摘採7日前まで	1回		1回
	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ ツマグロアオカスミカメ	1000～2000					
	コミカンアブラムシ	2000					