

フェニックス顆粒水和剤									
作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数		
もも	ハマキムシ類	4000	200~700	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)		
ネクタリン	モモハマグリガ シンクイムシ類 ケムシ類								
おうとう	ハマキムシ類								
すもも	シンクイムシ ケムシ類								
なし	ハマキムシ類 シンクイムシ類 ケムシ類								
りんご	ハマキムシ類	4000~6000							
	ギンモンハマグリガ キンモンホソガ ヨモギエダシヤク シンクイムシ類 ケムシ類								
ぶどう	ハスモンヨトウ ハマキムシ類 ケムシ類	4000		収穫14日前まで					
キウイフルーツ	ハマキムシ類			収穫7日前					
かんきつ	ミカンハマグリガ ハマキムシ類 ケムシ類 アゲハ類			収穫前日まで					
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	ケムシ類	4000	200~700	2回以内	2回以内	3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)			
うめ									
かき	カキノヘタムシガ イラガ類	2000	100~300	収穫7日前まで	6回以内	2回以内			
トマト	トマトキバガ								
ミニトマト	ハスモンヨトウ オオタバコガ								
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000~4000							
おうぎ	ヨトウムシ	2000	2000	2000	6回以内	6回以内 (1年間に3回以内)			
キャベツ	ヨトウムシ オオタバコガ アオムシ コナガ ハスモンヨトウ ウワバ類	16	1.6	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による 散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び無人航空機 散布は3回以内)		
		20	2.0						
		32	3.2						
はくさい	ヨトウムシ オオタバコガ アオムシ コナガ ハスモンヨトウ ウワバ類	16	1.6						
		20	2.0						
		2000~4000	100~300						
レタス	ウワバ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	16	1.6		2回以内	2回以内		無人航空機による 散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び航空機散布 は合計2回以内)
		20	2.0						
非結球レタス	ウワバ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	16	1.6						
		20	2.0						
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ	16	1.6	3回以内		3回以内	無人航空機による 散布	3回以内	
		20	2.0						
だいこん	ハイマダラノメイガ コナガ	2000~4000	100~300			収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による 散布	2回以内
はつかだいこん									
きゅうり にがうり									
なす	ウリノメイガ	4000	100~300			3回以内	3回以内	散布	3回以内
	ハスモンヨトウ								
ピーマン とうがらし類	オオタバコガ	2000~4000	100~300		3回以内	3回以内	散布	2回以内	
ブロッコリー	ヨトウムシ コナガ ハスモンヨトウ	16	1.6		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による 散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び無人航空機 散布は2回以内)	
		20	2.0						
		32	3.2						
すいか	ハイマダラノメイガ ヨトウムシ コナガ ハスモンヨトウ	2000~4000	100~300	3回以内		3回以内	無人航空機による 散布	2回以内	
	ハスモンヨトウ ウリノメイガ オオタバコガ								
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	16~32	0.8~1.6						
	2000~6000	100~300	100~300	3回以内		3回以内	無人航空機による 散布	2回以内	
ヒルガオハマグリガ	6000								
さといも	ハスモンヨトウ	2000~4000	100~300	3回以内		3回以内	無人航空機による 散布	2回以内	
アスパラガス	オオタバコガ ヨトウムシ	2000~4000	100~300	3回以内		3回以内	散布	2回以内	
	ハスモンヨトウ	2000							
とうもろこし ヤングコーン	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2000~4000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
	アワノメイガ オオタバコガ	32						3.2	
飼料用とうもろこし (子実)	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2000~4000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
そば	ハスモンヨトウ	2000~6000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
非結球あぶらな科葉 菜類 (チンゲンサイを除く)	コナガ	2000~4000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
チンゲンサイ	ハスモンヨトウ								
メロン	ウリノメイガ オオタバコガ								
かぼちゃ	ハスモンヨトウ	32	3.2	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
しょうが	アワノメイガ ハスモンヨトウ								
みしまさいこ	ハスモンヨトウ	2000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめ、 さやいんげん、 さやえんどうを除く)		2000~4000							
さやいんげん		アズキノメイガ							
さやえんどう	ハスモンヨトウ	2000~4000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
えだまめ	シロイチモジヨトウ	2000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
だいず	ハスモンヨトウ マメシンクイガ	2000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
あずき	ヨトウムシ アズキノメイガ	2000~6000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
にんじん	ヨトウムシ	2000~4000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
オクラ	ハスモンヨトウ								
かぶ	コナガ ハイマダラノメイガ								
カリフラワー	ヨトウムシ	2000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
メキャベツ	アオムシ ウワバ類 コナガ								
わさびだいこん	コナガ	32	3.2	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
やまのいも	ナガイモコガ ハスモンヨトウ								
やまのいも(むかご)	ナガイモコガ ハスモンヨトウ	2000~4000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
てんさい	ヨトウムシ	40	200~400	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
	50								
	5000~6000								
はずいも(葉柄)	ハスモンヨトウ	2000	200~400	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
セルリー		2000~4000							
食用金魚草		4000							
食用ミニバラ	ハスモンヨトウ	2000	200~400	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
しよくようほおずき	ハスモンヨトウ	2000	200~400	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
しそ	ハスモンヨトウ	2000	200~400	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
しそ(花穂) バジル	シロイチモジヨトウ								
みょうが(花穂)	ハスモンヨトウ	2000	200~400	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
みょうが(茎葉)	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ								
きく(葉)	ハスモンヨトウ	4000	200~400	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
ごぼう ばれいしょ	ハスモンヨトウ	2000~4000	200~400	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャハマキ ヨモギエダシヤク ハスモンヨトウ	2000	200~400	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
花き類・観葉植物 (きく、りんどうを除く)	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		
きく	オオタバコガ ハスモンヨトウ								
りんどう	オオタバコガ ハスモンヨトウ リンドオウホソハマキ	2000	100~300	3回以内	3回以内	無人航空機による 散布	2回以内		