

ロムダンフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	本剤の 使用回数	テブフェノジドを含む 農薬の総使用回数	
ぶどう	ケムシ類	3000	200～700	収穫前日 まで	散布	2回以内	2回以内	
りんご	ハマキムシ類 キリガ類	1500～ 3000						
	シャクトリムシ類	3000						
小粒核果類	ケムシ類							
おうとう	ハマキムシ類	2000		収穫7日前 まで		3回以内	3回以内	
もも ネクタリン	ケムシ類 ハマキムシ類							
なし								
マンゴー	ドクガ類 ハマキムシ類	2000	200～700	収穫21日前 まで		散布	2回以内	2回以内
はくさい キャベツ レタス	ハスモンヨトウ	2000～4000	100～300	収穫前日 まで				
いちご		2000	100～300	収穫3日前 まで				
れんこん				収穫14日前 まで				
だいず				収穫21日前 まで				
ほうれんそう				収穫7日前 まで				
そば				2000～3000			2000～3000	2回以内
かんしょ		ナカジロシタバ	2000～3000	2000～3000	収穫7日前 まで		3回以内	3回以内
さといも さといも(葉柄)	ハスモンヨトウ	2000	2000	収穫前日 まで				
ねぎ	シロイチモジヨトウ		2000	2000	収穫7日前 まで			
にんじん	ヨトウムシ	2000～4000	200～400	200～400	2回以内		2回以内	
しょうが	ハスモンヨトウ	2000	2000	2000	3回以内		3回以内	
てんさい	ヨトウムシ	2000	2000	2000	2回以内		2回以内	
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ	1000	200～400	200～400				2000
	ヨモギエダシャク	2000						
花き類・観葉植物 (きくを除く)	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000	100～300	発生初期	5回以内	5回以内		
きく	シロイチモジヨトウ オオタバコガ ハスモンヨトウ							
とうき	キアゲハ						3000	3000
樹木類	ケムシ類	2000～3000	200～700	発生初期				