

コルト顆粒水和剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	10a当り 使用液量 (L)	使用時期	使用方法	本剤及び ピリフルキナゾン を含む農薬の 総使用回数
かんきつ	アブラムシ類	16	4	200～700	無人航空機による散布	3回以内
		20	5			
		40	10			
		4000				
	チャノキイロアザミウマ コナジラミ類 ミカンバエ成虫	3000				
	カイガラムシ類 (アカマルカイガラムシを除く)	2000～3000				
りんご	アカマルカイガラムシ	2000				
	アブラムシ類	3000～6000				
	カイガラムシ類	3000～4000				
なし	リンゴワタムシ	3000				
	アブラムシ類 チュウゴクナシキジラミ	4000				
	カイガラムシ類	3000～4000				
もも ネクタリン	チャノキイロアザミウマ	3000				
	アブラムシ類	4000				
かき	アブラムシ類	4000				
	カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ	2000～3000				
ぶどう	アブラムシ類	4000				
	カイガラムシ類 ツマグロアオカスミカメ	3000				
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	3000				
おうとう	オウトウシヨウジョウバエ	10000				
	カイガラムシ類	2000				
小粒核果類	アブラムシ類	2000～4000				
キウイフルーツ	クワシロカイガラムシ	3000				
ばれいしょ	アブラムシ類	4000～8000	100～300	収穫前日まで	無人航空機による散布	3回以内
		400	25			
		50	3.2			
かんしょ	コナジラミ類 アブラムシ類	4000	100～300			
やまのいも にがうり カリフラワー こんにゃく	アブラムシ類	4000	100～300			
てんさい		4000～6000				
		32	1.6			
		40	2			
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類	40	3.2			
		64	3.2			
なす	アブラムシ類 コナジラミ類 カスミカメムシ類	3000～4000	100～300			
		4000	100～300			
		ピーマン とうがらし類 (甘長とうがらしを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	4000	100～300	
		しろうり	コナジラミ類	4000	100～300	
キャベツ	アブラムシ類	3000～4000				
	ネギアザミウマ	3000				
	アブラムシ類	16	1.6			
レタス	アブラムシ類	20	2			
		32	3.2			
		3000～4000	100～300			
非結球レタス	アブラムシ類	24	1.6			
		30	2			
		48	3.2			
カリフラワー ブロッコリー	アブラムシ類	4000	100～300			
ブロッコリー	アブラムシ類	25	1.6			
		32	2			
		50	3.2			
はくさい	アブラムシ類	4000	100～300			
		24	1.6			
		30	2			
		48	3.2			
アスパラガス	コナジラミ類 ネギアザミウマ カスミカメムシ類	4000	100～700			
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	4000	100～300			
ねぎ	アブラムシ類 ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	2000	100～300			
		16	1.6			
		20	2			
		32	3.2			
たまねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	2000	100～300			
にら	ネギアザミウマ	2000	100～300			
豆類 (種実、ただし、 らっかせいを除く)	アブラムシ類	4000～6000	100～300			
豆類 (未成熟、ただし、 さやいんげんを除く)				収穫7日前まで		
さやいんげん				収穫前日まで		
しよくようぼうずき				コナジラミ類	4000	収穫3日前まで
茶	クワシロカイガラムシ	2000～3000	1000			
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャトゲコナジラミ アブラムシ類	2000～3000	200～400			
	ツマグロアオカスミカメ マダラカサハラムシ	2000	200～400			
チューリップ	アブラムシ類	40～120	3			
	コナジラミ類	40～120	3			
花き類・観葉植物 (チューリップを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	40～120	3			
たばこ	アブラムシ類	40～120	25～180			