

サムコルフロアブル 10

| 作物名   | 適用害虫名   | 希釈倍数<br>(倍) | 使用液量<br>(L/10a) | 使用時期         | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法                     | クロラントラニプロールを含む農薬<br>の総使用回数     |          |
|-------|---|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| りんご   | シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>キンモンホソガ<br>ギンモンハモグリガ<br>ケムシ類<br>ヒメボクトウ<br>ヨモギエダシャク<br>オオタバコガ | 2500~5000   | 200~700         | 収穫前日まで       | 3回以内        | 散布                       | 3回以内                           |          |
| なし    | ケムシ類<br>シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>ヒメボクトウ   |             |                 |              |             |                          |                                |          |
| かき    | ハマキムシ類<br>ケムシ類<br>ヒロヘリアオイラガ<br>カキノヘタムシガ<br>ハスモンヨトウ<br>フタモンマダラメイガ                  | 5000        |                 |              |             |                          |                                |          |
| ぶどう   | ハマキムシ類<br>モンキクロノメイガ<br>ケムシ類<br>クビアカスカシバ   |             |                 |              |             |                          |                                |          |
| おうとう  | コスカシバ<br>ハマキムシ類<br>ケムシ類   | 2500~5000   |                 |              |             |                          |                                |          |
|       | オウトウショウジョウバエ  | 2500        |                 |              |             |                          |                                |          |
| うめ    | ケムシ類<br>ノコメガリキリガ<br>コスカシバ   | 2500~5000   |                 |              |             |                          |                                |          |
|       | ハマキムシ類  | 2500        |                 |              |             |                          |                                |          |
| すもも   | シンクイムシ類   | 2500        |                 |              |             |                          |                                |          |
|       | ケムシ類<br>ハマキムシ類  | 2500~5000   |                 |              |             |                          |                                |          |
| あんず   |   | 2500        |                 |              |             |                          |                                |          |
| もも    | シンクイムシ類<br>モモハモグリガ<br>ハマキムシ類<br>コスカシバ   | 5000        | 100~300         | 収穫前日まで       | 2回以内        | 散布                       | 4回以内(粒剤は1回<br>以内、水和剤は3回<br>以内) |          |
| ネクタリン |   |             |                 |              |             |                          |                                |          |
| ふさすぐり |   |             |                 |              |             |                          |                                | スグリコスカシバ |
| さとうきび | メイチュウ類<br>ツマジロクサヨトウ   | 5000        | 100~300         | 収穫30日前ま<br>で | 3回以内        | 散布<br><br>無人航空機<br>による散布 |                                |          |
|       |   | 50          | 2.4             |              |             |                          |                                |          |
| 茶     | チャノコカクモンハマキ<br>チャハマキ<br>ヨモギエダシャク  | 2000        | 200~400         | 摘採3日前まで      | 1回          | 散布                       | 1回                             |          |
|       | チャノホソガ<br>ハスモンヨトウ   | 2000~4000   |                 |              |             |                          |                                |          |