

ジェイエース水溶剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ	1500倍	200～700L /10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
いちじく	アザミウマ類	2000倍		収穫45日前まで	1回		1回
キャベツ	ハスモンヨトウ コナガ、アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 タマナキウワバ	1000～1500倍	100～300L /10a	収穫30日前まで			1回
はくさい	ハスモンヨトウ コナガ、アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類				1回		
レタス 非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000倍	100～300L /10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	オオタバコガ						
カリフラワー	ヨトウムシ	1500倍	100～300L /10a	収穫21日前まで	1回		1回
チンゲンサイ みずな	アブラムシ類			収穫7日前まで			
オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコバイ	1000倍	100～300L /10a	収穫開始7日前まで	2回以内		2回以内
ほうれんそう	アブラムシ類			収穫30日前まで			
にんにく	アブラムシ類 ネギコガ	1000倍	100～300L /10a	収穫45日前まで	1回	1回	
やまのいも	ジャガイモヒゲナガアブラムシ			収穫7日前まで			
ばれいしょ	オオニジュウヤホシテントウ ヨトウムシ	1000～2000倍	25L/10a	収穫30日前まで	2回以内	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)	
	アブラムシ類						300倍
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000～1500倍	100～300L /10a	収穫21日前まで	5回以内	5回以内	
てんさい	ヨトウムシ	300倍	25L/10a	収穫45日前まで	3回以内	4回以内 (育苗期の灌注は1回以内、散布は3回以内)	
	テンサイモグリハナバエ	1000倍	100～300L /10a				
	テンサイトビハムシ	60～100倍	ペーパーポット1冊当たり1L(3L/m ²)	育苗期	1回		灌注
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000倍	200～400L /10a	摘採45日前まで	1回	1回	
	チャノココクモンハマキ	1000～1500倍					
だいず	アブラムシ類 ハスモンヨトウ	1000倍	100～300L /10a	収穫60日前まで	3回以内	3回以内	
あずき	ノメイガ類 アブラムシ類			収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
いんげんまめ	アブラムシ類			100～300L /10a	発生初期	5回以内	5回以内
ごぼう							
花き類・観葉植物(ばら、きくを除く)	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～1500倍	200～700L /10a	発生初期	5回以内	5回以内	
ばら	アブラムシ類 アザミウマ類						1000倍
きく	アブラムシ類 アザミウマ類	1000倍	200～700L /10a	発生初期	5回以内	5回以内	
	マメハモグリバエ オオタバコガ	1500倍					
つつじ類	ツツジゲンバイ	1500～2000倍	25～180L /10a	収穫10日前まで	2回以内	2回以内	
つばき類	チャドクガ						
さくら	アメリカシロヒトリ	1000～1500倍	25～180L /10a	発生初期	5回以内	5回以内	
	モンクロシャチホコ						
たばこ	ヨトウムシ タバコアオムシ アブラムシ類	1000倍	0.3L/m ²	発生初期	5回以内	5回以内	
芝	スジキリヨトウ シバツトガ		0.3～0.5L/m ²				
	タマナヤガ		0.3～1L/m ²				
	シバオサゾウムシ成虫						