

ジェイエース粒剤

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	アオムシ、コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内(定植までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)		
はくさい								
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (2g/株)					株元散布	
だいこん	アオムシ、コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前		作条散布	1回		
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫21日前まで		株元散布			
なばな		6kg/10a (2g/株)	定植時		土壌混和処理			
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		作条散布 又は植穴散布、			
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ							
ごぼう	アブラムシ類	3～6kg/10a	収穫75日前まで		1回	株元散布	2回以内(株元散布は1回以内、散布は1回以内)	
みずな		6kg/10a	定植時			作条散布 後土壌混和	1回	
ばれいしょ		3～6kg/10a	植付時	作条散布		3回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)		
こまつな			は種前	作条散布後 土壌混和		1回		
チンゲンサイ			定植時					
花き類・観葉植物 (キク、トルコギキョウを除く)		アザミウマ類	1～2g/株(但し、 9kg/10aまで)	発生初期		5回以内	株元散布	5回以内
きく		アブラムシ類 アザミウマ類	6～9g/10a 1～2g/株(但し、 9kg/10aまで)					
	マメハモグリバエ	6～9g/10a						
	トルコギキョウ	アブラムシ類 アザミウマ類	1～2g/株(但し、 9kg/10aまで)					
つつじ類	ツツジグンバイ	2g/株						
たばこ	ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a	移植前	1回	作条散布 後土壌混和	2回以内		
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	10kg/10a	発生初期	5回以内	全面散布	5回以内		
	タマナヤガ	5～10kg/10a						