

アーデント水和剤

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 (倍) | 使用液量 L/10a | 使用時期 | 本剤の使用 回数 | 使用方法 | 使用回数 (*) | | |
|----------------|---|-------------|---------------|---------|-------------|------|----------------------|---------|--------|
| りんご | シンクイムシ類 キンモンホソガ アブラムシ類 ハダニ類 | 1000 | 200~700 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | |
| なし | シンクイムシ類 アブラムシ類 ハダニ類 カメムシ類 | | | | | | | | |
| かき | カメムシ類 アザミウマ類 ハダニ類 カキノヘタムシガ | | | | | | | | |
| もも | モモハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 ハダニ類 カメムシ類 アザミウマ類 ドウガネブイブイ | | | 収穫前日まで | | | | | |
| ネクタリン | モモハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 ハダニ類 カメムシ類 アザミウマ類 | | | | | | | | |
| 小粒核果類 | ハダニ類 | | | | | | | | |
| ぶどう | アザミウマ類 ハダニ類 フタテンヒメヨコバイ | | | 収穫7日前まで | | | | 4回以内 | 4回以内 |
| いちじく | ハダニ類 アブラムシ類 ショウジョウバエ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ | | | 収穫前日まで | | | | 2回以内 | 2回以内 |
| マンゴー | アザミウマ類 | | | 収穫3日前まで | | | | | |
| すいか | アブラムシ類 ハダニ類 | | | 750 | | | | 150~300 | 収穫前日まで |
| メロン | ミナミキイロアザミウマ ミカンキイロアザミウマ | | | | | | | | |
| いちご | アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ | 1000 | 150~300 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | | | |
| きゅうり | アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ | | | | | | | | |
| なす | アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ | | | | | | | | |
| トマト | オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ | | | | | | | | |
| ミニトマト | オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ | | | 3回以内 | | | 3回以内 | | |
| ピーマン とうがらし類 | アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ | | | 2回以内 | | | 2回以内 | | |
| アスパラガス | オオタバコガ アブラムシ類 カメムシ類 ハダニ類 | | | 150~500 | | | | | |
| 食用ぎく | アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ ヨトウムシ | | | 150~300 | | | 発生初期ただし、 収穫14日前まで | 1回 | 1回 |
| しそ科葉菜類 | ハダニ類 | | | 100~300 | | | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
| パセリ | ネギアザミウマ | | | | | | 収穫7日前まで | | |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ カンザワハダニ ヨモギエダシヤク | 200~400 | 摘採14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | | | | |
| きく | アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ | 150~300 | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | | | | |