モベントフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 アザミウマ類 カイガラムシ類 サビダニ類 チャノホコリダニ ミカンハダニ ミカンコナジラミ	2000	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類 アザミウマ類 カイガラムシ類 サビダニ類 チャノホコリダニ	32	4～6L/10a			無人航空機による散布	
		40	6～8L/10a				
		50	8～10L/10a				
		80	10～15L/10a				
		100	15～20L/10a				
		160	20～30L/10a				
		250	30～40L/10a				
		320	40～50L/10a				
りんご	アブラムシ類 カイガラムシ類 ハダニ類 リンゴサビダニ リンゴワタムシ	2000	200～700L/10a	収穫14日前まで		散布	
なし	アザミウマ類 アブラムシ類 カイガラムシ類 ハダニ類 ニセナシサビダニ						
びわ	ビワヒシラミ			収穫21日前まで			
ぶどう	カイガラムシ類 アザミウマ類 ハダニ類 ブドウサビダニ			収穫7日前まで			
かき	アザミウマ類 カイガラムシ類						
パイナップル	パイナップルコナカイガラムシ			収穫14日前まで			
もも ネクタリン 小粒核果類	アブラムシ類			収穫7日前まで			
おうとう	ハダニ類 カイガラムシ類						
オリーブ	カイガラムシ類						
オリーブ（葉）				収穫90日前まで			
キャベツ	アザミウマ類 アブラムシ類 コナガ		100～300L/10a			無人航空機による散布	
	アブラムシ類 コナガ	2000～4000					
	アザミウマ類 アブラムシ類 アオムシ コナガ	24	1.6～1.7L/10a	収穫7日前まで			
		32	1.7～2.0L/10a				
		40	2.0～2.8L/10a				
		50	2.8～3.5L/10a				
		64	3.5～4.5L/10a				
		80	4.5～5.5L/10a				
		100	5.5～7.0L/10a				
		125	7.0～8.5L/10a				
		160	8.5～11L/10a				
		200	11～14L/10a				
		250	14～17L/10a				
		320	17～20L/10a				
はくさい	アブラムシ類 コナガ	4000	100～300L/10a			散布	
ブロッコリー	アザミウマ類 アオムシ コナガ	2000					
	アブラムシ類	2000～4000					
	アザミウマ類 アブラムシ類	24	1.6～1.7L/10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布	
		32	1.7～2.0L/10a				
		40	2.0～2.8L/10a				
		50	2.8～3.5L/10a				
		64	3.5～4.5L/10a				
		80	4.5～5.5L/10a				
		100	5.5～7.0L/10a				
		125	7.0～8.5L/10a				
		160	8.5～1.0L/10a				
		200	11～14L/10a				
		250	14～17L/10a				
		320	17～20L/10a				
レタス	アザミウマ類	2000	100～300L/10a			散布	
	アブラムシ類	2000～4000					
	アザミウマ類 アブラムシ類	24	1.6～1.7L/10a			無人航空機による散布	
		32	1.7～2.0L/10a				
		40	2.0～2.8L/10a				
		50	2.8～3.5L/10a				
		64	3.5～4.5L/10a				
		80	4.5～5.5L/10a				
		100	5.5～7.0L/10a				
		125	7.0～8.5L/10a				
		160	8.5～1.0L/10a				
		200	11～14L/10a				
		250	14～17L/10a				
		320	17～20L/10a				
非結球レタス	アザミウマ類	2000	100～300L/10a	収穫14日前まで		散布	
	アブラムシ類	2000～4000					
	アザミウマ類 アブラムシ類	24	1.6～1.7L/10a			無人航空機による散布	
		32	1.7～2.0L/10a				
		40	2.0～2.8L/10a				
		50	2.8～3.5L/10a				
		64	3.5～4.5L/10a				
		80	4.5～5.5L/10a				
		100	5.5～7.0L/10a				
		125	7.0～8.5L/10a				
		160	8.5～11L/10a				
		200	11～14L/10a				
		250	14～17L/10a				
		320	17～20L/10a				
ほうれんそう	アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	2000	100～300L/10a			散布	
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000		収穫7日前まで			
		24	2～3.6L/10a			無人航空機による散布	
		50	3.6～7.5L/10a				
		100	7.5～1.5L/10a				
きゅうり	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000	100～300L/10a	収穫前日まで		散布	
	アザミウマ類 ハダニ類	500	50ml/株	育苗期後半～定植当日	1回	株元灌注	3回以内（灌注は1回以内）
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml/株				
メロン すいか	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	アザミウマ類 ハダニ類	500	50ml/株	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	
			25～50ml/株				
	アブラムシ類 コナジラミ類						
ズッキーニ		2000	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
なす	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ ハダニ類 コナカイガラムシ類 うどんこ病						3回以内（灌注は1回以内）
	アザミウマ類 チャノホコリダニ ハダニ類 うどんこ病	500	50ml/株	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml/株				
ピーマン とうがらし類	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ ハダニ類	2000	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	アザミウマ類 チャノホコリダニ ハダニ類	500	50ml/株	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml/株				
トマト ミニトマト	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 トマトサビダニ	2000	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
アスパラガス	アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000					
未成熟そらまめ	アザミウマ類						
	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類						
いちご	アザミウマ類 ハダニ類	500	50ml/株	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	3回以内（灌注は1回以内）
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml/株				
	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	250	25ml/株				
しそ	アザミウマ類	2000	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
にんにく	チューリップサビダニ	4000		収穫21日前まで	2回以内		2回以内
ねぎ	アザミウマ類	2000					
ばれいしょ	アブラムシ類 ハダニ類	4000		収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		64	1.6～3L/10a				
		100	3～5L/10a				
		160	5～8L/10a				
		200	8～10L/10a				
		250	10～12L/10a				
		320	12～16L/10a				
		400	16～20L/10a				
さといも		2000	100～300L/10a			散布	
てんさい	アブラムシ類 ハダニ類	2000～4000	100～300L/10a	収穫14日前まで		散布	
		16	1.6～2.1L/10a			無人航空機による散布	
		20	1.6～2.6L/10a				
		40	3.6～5.3L/10a				
みょうが（花穂）	アブラムシ類	2000	100～300L/10a	収穫前日まで		散布。但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布直後花穂に掛散しない状態で散布する	
みょうが（茎葉）				みょうが（花穂）の収穫前日まで但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期前まで		散布	
チューリップ	チューリップサビダニ	4000		鱗芽後～球根掘り取り前まで	2回以内		2回以内