

ディアナ WDG

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数		
りんご	シンクイムシ類 ヨモギエダシャク ケムシ類 キリガ類	5000～10000倍	200～700L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
	ハマキムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	5000～15000倍							
もも ネクタリン	モモハモグリガ シンクイムシ類 ハマキムシ類 アザミウマ類	5000～10000倍							
おうとう	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類 アザミウマ類								
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 チュウゴクナシキジラミ アザミウマ類								
小粒核果類(うめ、すももを除く)	ハマキムシ類								
すもも	シンクイムシ類	5000倍							
ぶどう	アザミウマ類 ハマキムシ類 クビアカスカシバ ハスモンヨトウ	5000～10000倍						2回以内	3回以内(果房浸漬は1回以内、散布は2回以内)
かき	アザミウマ類 ハマキムシ類 カキノヘタムシガ								
かんきつ	ミカンハモグリガ アザミウマ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシャク ケムシ類 ハマキムシ類 アゲハ類								
	ハスモンヨトウ		10000倍						
くり	モモノゴマダラノメイガ	100倍	2L/10a	無人航空機による散布	2回以内				
いちじく	アザミウマ類	5000倍							
	ショウジョウバエ類	10000倍							
うめ	ケムシ類 ハマキムシ類	5000～10000倍	200～700L /10a	散布					
ブルーベリー	アザミウマ類 ハマキムシ類 オウトウショウジョウバエ ブルーベリータマバエ								
アロニア	シンクイムシ類				10000倍				
マンゴー	チャノキイロアザミウマ				5000～10000倍				
さんしょう(果実)	アザミウマ類								