

ヨーバルフロアブル							
作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラニプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ネキリムシ類 ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ネギアザミウマ	200	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用度条約1.5~4L)当たり0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び航空機散布は合計3回以内)
	コナガ アオムシ ウワバ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ オオタバコガ アブラムシ類 アザミウマ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	25	1.6L/10a				無人航空機による散布	
はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ネキリムシ類	200	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び航空機散布は合計3回以内)
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ オオタバコガ カブラハバチ類 アブラムシ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	25	1.6L/10a				無人航空機による散布	
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ネキリムシ類 アブラムシ類	200	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び航空機散布は合計3回以内)
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ウワバ類 アブラムシ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	25	1.6L/10a				無人航空機による散布	
あぶらな科葉菜類	コナガ	5000	100~300L/10a	2回以内	2回以内	散布	2回以内
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2500~5000					
	コナジラミ類	2500					
ねぎ	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ネキリムシ類 アブラムシ類	200	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
	シロイチモジヨトウ ネギコガ ハモグリバエ類 アザミウマ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	
	25	1.6L/10a				無人航空機による散布	
レタス 非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類	200	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
	ウワバ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	25	1.6L/10a				無人航空機による散布	
えだまめ	マメシクイガ ハスモンヨトウ	5000~10000	100~300L/10a	3回以内	3回以内	散布	3回以内
	ウコンノメイガ コガネムシ類	5000					
	マメシクイガ ウコンノメイガ	50					
だいず	マメシクイガ ハスモンヨトウ	5000~10000	100~300L/10a	2回以内	2回以内	散布	2回以内
	ウコンノメイガ コガネムシ類	5000					
	マメシクイガ ウコンノメイガ ハスモンヨトウ コガネムシ類	50					
さいも	ハスモンヨトウ	5000	100~300L/10a	2回以内	2回以内	散布	2回以内
	50	1.6L/10a					
	無人航空機による散布						
未成熟とうもろこし	アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	5000	100~300L/10a	3回以内	3回以内	散布	3回以内
	50	1.6L/10a					
	キスジノミハムシ	2500	100~300L/10a				
だいこん	アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ	2500~5000	100~300L/10a	2回以内	2回以内	散布	2回以内
	2500~5000						
	2500~5000						
さいえんどう	ハスモンヨトウ	2500~5000	100~300L/10a	2回以内	2回以内	散布	2回以内
なす	ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類	200	25ml/株	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
	ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	コナジラミ類 アザミウマ類	2500					
トマト ミニトマト	ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類	200	25ml/株	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
	ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	トマトキバガ コナジラミ類 アザミウマ類	2500					
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類	200	25ml/株	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
	オオタバコガ アブラムシ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	コナジラミ類	2500					
きゅうり	ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類	200	25ml/株	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
	ハスモンヨトウ ウリノメイガ ハモグリバエ類 アブラムシ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	コナジラミ類 アザミウマ類	2500					
メロン	ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類	200	25ml/株	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
	ウリノメイガ ハモグリバエ類 アブラムシ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	
	コナジラミ類 アザミウマ類	2500					
すいか	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類	200	25ml/株	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
	ハスモンヨトウ オオタバコガ ウリノメイガ アブラムシ類 ハモグリバエ類	2500~5000	100~300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	
	コナジラミ類 アザミウマ類	2500					
なし	ヒメボクトウ ハマキムシ類 シンクイムシ類	5000~10000	200~700L/10a	2回以内	2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類	5000					
	コスカシバ ハマキムシ類 シンクイムシ類 モモハマグリガ コガネムシ類						
ぶどう	モンキクロノメイガ チャノキイロアザミウマ クビアカスカシバ ハマキムシ類 コガネムシ類	5000~10000		収穫7日前まで			
かき	カキノヘタムシガ ハマキムシ類			収穫前日まで			
りんご	ハマキムシ類 シンクイムシ類 ギンモンハマグリガ ギンモンホソガ ヒメボクトウ オオタバコガ コガネムシ類			収穫前日まで			
	ヨモギエダシヤク						
小粒核果類(すももを除く)	ケムシ類			収穫前日まで			
すもも	ケムシ類 シンクイムシ類	5000					
おうとう	ケムシ類 ハマキムシ類 オウトウショウジョウバエ コガネムシ類			収穫前日まで			
茶	チャノドリヒメコバイ ナガチャコガネ成虫	2500	200~400L/10a	1回	1回	散布	1回
	チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ、 ヨモギエダシヤク、 チャノキイロアザミウマ マダラカサハラハムシ	2500~5000					
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)	ハスモンヨトウ オオタバコガ		100~300L/10a				
きく	アザミウマ類	2500					
トルコギキョウ	ハスモンヨトウ	200	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	発生初期	3回以内		3回以内
	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2500~5000	100~300				
樹木類	ケムシ類	5000	200~700L/10a				