

キックオフ顆粒水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントリプロールを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数						
なし	カメムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内						
もも	シンクイムシ類 カメムシ類 ハマキムシ類 モモハモグリガ			収穫3日前まで	2回以内		2回以内							
ネクタリン				収穫14日前まで	3回以内		3回以内							
うめ	ケムシ類 カメムシ類			収穫前日まで	3回以内		3回以内		4回以内 (塗布は1回以内、散布は3回以内)					
かき	コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類 アザミウマ類 ケムシ類			100倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (30X60cm・使用土壌1.5～4L)当り0.5L		定植前日～定植時		1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内)	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)		
キャベツ	アブラムシ類 コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ アザミウマ類	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)												
はくさい	アブラムシ類 コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)												
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヒメダイコンバエ	4回以内 (は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)												
レタス 非結球レタス	アブラムシ類 オオタバコガ カブラヤガ ナモグリバエ ハスモンヨトウ	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植時の株元散布は合計2回以内)												
ねぎ	ハモグリバエ類 アザミウマ類 シロイチモジヨトウ クロバネキノコバエ類	2000倍	100～300L/10a			収穫30日前まで		3回以内				散布	4回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は3回以内)	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
さとうきび	カンシャコバナネガカメムシ サトウキビチビアザミウマ アワヨトウ イナゴ類 アブラムシ類 メイチュウ類 ツマジロクサヨトウ													