

| 作物名                     | 適用病害虫名                       | 使用量<br>(/10a) | 使用時期                                   | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法         | イソキサチオン<br>を含む農薬の<br>総使用回数   |              |      |
|-------------------------|------------------------------|---------------|--|-------------|--------------|--|--------------|------|
| はくさい                    | コオロギ類<br>ネキリムシ類              | 3kg           | は種時または<br>定植時～生育初期<br>ただし、収穫14日前まで     | 1回          | 土壌表面<br>株元処理 | 1回   |              |      |
| キャベツ<br>だいこん<br>はつかだいこん | ネキリムシ類                       |               | は種時または<br>定植時                          | 4回以内        |              | 5回以内<br>粉剤および粉粒剤の<br>は種時の処理は<br>合計1回以内、<br>粉剤および粉粒剤<br>の定植時は<br>合計1回以内、<br>粉剤の土壌表面散布<br>は1回以内、<br>粒剤の土壌表面株元<br>処理は2回以内 |              |      |
| ブロッコリー                  |                              |               | 定植時～生育初期 ただし、<br>収穫14日前まで              |             |              |  |              |      |
| レタス                     |                              |               | は種時または<br>定植時～生育初期<br>ただし、<br>収穫21日前まで | 2回以内        |              |  |              |      |
| 非結球レタス                  |                              |               | は種時または<br>定植時                          |             |              |  |              |      |
| なばな                     |                              |               | 発芽期まで                                  | 1回          |              |  |              |      |
| だいず                     |                              |               | は種時～<br>本葉2葉期                          | 2回以内        |              |  | 1回           |      |
| えだまめ                    |                              |               | 収穫21日前まで                               |             |              |  |              |      |
| いちご                     |                              |               | ハスモンヨトウ                                | 収穫前日まで      |              |  | 1回           | 1回   |
| 葉ごぼう                    |                              |               | ネキリムシ類                                 | は種時～子葉展開期   |              |  | 2回以内         | 2回以内 |
| さといも<br>ごぼう             |                              |               |  | 収穫14日前まで    |              |  | 4回以内         | 4回以内 |
| かぶ                      | 収穫30日前まで                     |               |  | 2回以内        |              | 2回以内   |              |      |
| ねぎ                      | 収穫30日前まで                     |               |  |             |              |  |              |      |
| にんじん                    | 発芽期～生育初期<br>ただし、<br>収穫14日前まで |               |  | 4回以内        |              | 4回以内   |              |      |
| メロン                     | コオロギ類                        |               |  | 収穫直前まで      |              | 1回   | 配置           |      |
| えごま(種子)                 | ネキリムシ類                       |               | 定植時                                    | 1回          |              |  | 土壌表面<br>株元処理 |      |
| たばこ                     |                              | 植付時           | 株元処理                                   |             |              |  |              |      |