

モスピランジェット

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む農薬の総使用回数		
いちご	温室、ビニールハウス等密閉できる場所	アブラムシ類 アザミウマ類	くん煙室容積 400m3 床面積 200m2 ×高さ2m 当り50g	収穫前日まで	2回以内	くん煙	3回以内 (粒剤の株元散布および土壌混和は合計1回以内、散布およびくん煙は合計2回以内)		
トマト ミニトマト		コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ			4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙および定植後の株元散布は合計3回以内)				
きゅうり		コナジラミ類			5回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙および1%粒剤の株元散布は合計3回以内)				
なす すいか		アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ			4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙および定植後の株元散布は合計3回以内)				
メロン		アザミウマ類 アブラムシ類			3回以内				
ピーマン		アブラムシ類			3回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙および定植後の株元散布は合計2回以内)				
アスパラガス		アザミウマ類			2回以内				
ズッキーニ ズッキーニ(花)		アブラムシ類			2回以内				
ふき					収穫14日前まで		3回以内 (粒剤の株元散布は1回以内、散布およびくん煙は合計2回以内)		
みょうが (花穂)					収穫前日まで		※1	くん煙	
みょうが (茎葉)					※2				
みかん					アブラムシ類 カイガラムシ類		収穫3日前まで		3回以内
ぶどう					コナカイガラムシ類 ホソオビツチイロノメイガ		収穫14日前まで		2回以内
マンゴー					カイガラムシ類		収穫35日前まで		
アセロラ					アブラムシ類		収穫7日前まで		2回以内
花き類・観葉植物(トルコギキョウを除く)							発生初期		5回以内
トルコギキョウ					ミカンキイロアザミウマ				