

デミリン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	使用方法	本剤及びジフルベンズロンを含む農薬の 総使用回数			
りんご	キンモンホソガ シンクイムシ類	2000～4000	200～ 700L/10a	収穫30日前ま で	散布	3回以内			
	ギンモンハモグリガ	3000～6000							
	ケムシ類	4000							
なし	シンクイムシ類 ナシチビガ	2000～4000				100～ 300L/10a	収穫7日前ま で	散布	2回以内
かき	カキノヘタムシガ								
かんつき	ミカンハモグリガ	2000～3000							
	チャノキイロアザミウマ	2000							
もも	モモハモグリガ シンクイムシ類	2000～3000	100～ 300L/10a	収穫前日まで	散布				3回以内
メロン	ミナミキイロアザミウマ	1500～3000							
すいか		1000～2000							
きゅうり		1000							
ねぎ	タマネギバエ	2000	150～300ml/ ㎡	収穫21日前ま で	株元灌注	3回以内			
	クロバネキノコバエ類		300ml/ ㎡						
しょうが	アワノメイガ	1000	100～ 300L/10a	収穫前日まで	散布	1回			
茶	チャノホソガ	2000～4000	200～ 400L/10a	摘採21日前ま で					
	ヨモギエダシヤク	2000							
マッシュルーム	キノコバエ類	375	1.5L/ ㎡	覆土後 但し収 穫21日前まで	覆土表面散 布				
樹木類	ケムシ類 (若～中齢幼虫)	4000～8000	200～ 700L/10a	—	散布	3回以内			
からまつ	カラマツマダラメイガ (若～中齢幼虫)	4000～6000							
まつ類	ハバチ類 (若～中齢幼虫)						100	3L/10a	
	マツカレハ若齢幼虫	100	3L/10a						
		200	6L/10a	空中散布					