

バイスロイド EW

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シフルトリン を含む農薬の 総使用回数		
りんご	キンモンホソガ アブラムシ類 ギンモンハモグリガ モモチョッキリゾウムシ シンクイムシ類	2000～3000倍	200～700L	収穫 7日前 まで	4回以内	散布	4回以内		
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ ヨモギエダシャク	2000倍							
なし	ハマキムシ類 シンクイムシ類 アブラムシ類							2回以内	2回以内
大粒種ぶどう	チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍							
	コガネムシ類								
もも	モモハモグリガ アブラムシ類 シンクイムシ類	2000倍						3回以内	3回以内
おうとう	ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ	4000倍		2回以内	2回以内				
小粒核果類	アブラムシ類	3000倍							
かき	チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ カキノヘタムシガ	2000倍		収穫 14日前 まで	3回以内			3回以内	
かんきつ	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ				5回以内			5回以内	
だいず	カメムシ類	1000倍	100～300L	収穫 7日前 まで	3回以内	3回以内			
えだまめ				収穫 14日前 まで					
食用ぎく	アザミウマ類	3000倍	収穫 7日前 まで	2回以内	2回以内				
たばこ	タバコガ ヨトウムシ アブラムシ類	2000～3000倍	100～180L 収穫 10日前 まで						