

ビリーブ水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シハロトリン を含む農薬の 総使用回数	ジフルベンズ ロンを含む農薬 の総使用回数	
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 キンモンホソガ アブラムシ類	1500倍	200～700ℓ	収穫30日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内	
なし	シンクイムシ類 ナシチビガ アブラムシ類				2回以内				2回以内
みかん	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ				3回以内				3回以内
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類	100～300ℓ	収穫7日前 まで	3回以内	1回		1回	3回以内	
たまねぎ	ネギアザミウマ			3回以内					3回以内
すいか メロン	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	1000倍	100～300ℓ	収穫14日前 まで	1回		1回	3回以内	
らっきょう	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	1500倍			3回以内		2回以内		
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノキイロアザミウマ		200～400ℓ	200～400ℓ	摘採21日前 まで		1回	1回	1回