

トレボンエアー

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンブ ロックスを含 む農薬の総 使用回数		
稲	コブノメイガ イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	30倍	3 L	収穫14日前まで	3回以内	空中散布	3回以内		
	イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	8倍	0.8L						
	コブノメイガ フタオビコヤガ イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ フタオアビコヤガ								
麦類	ヒメビウンカ	8倍	1.6 L	収穫7日前まで 収穫3日前まで 収穫21日前まで 収穫前日まで 収穫7日前まで 収穫14日前まで	2回以内	無人航空機 による散	2回以内		
ばれいしょ	アブラムシ類				3回以内		3回以内	3回以内	3回以内
キャベツ	アブラムシ類 ヨトウムシ								
だいこん	アオムシ								
ブロッコリー	アオムシ				2回以内		2回以内	2回以内	2回以内
はくさい	アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ								
レタス	アブラムシ類				2回以内		2回以内	2回以内	2回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ								
だいず えだまめ	ハスモンヨトウ カメムシ類 マメシンクイガ ツメクサガ				0.8 L		0.8 L	2回以内	2回以内
あずき	アズキノメイガ				1.6 L		1.6 L	2回以内	2回以内
しょうが	アワノメイガ								
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類	3.2 L	3.2 L	3回以内	3回以内				