ランネート 45DF

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メソミルを含む農薬の総使用回数
かぼちゃ	ワタアブラムシ	1000	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
いちご	イチゴメセンチュウ イチゴセンチュウ			育苗期	4回以内		4回以内
				定植後生育初期			
	イチゴネグサレセンチュウ	1000～2000	1～2L/㎡	移植活着後（育苗期）		灌注	
	コガネムシ類幼虫		2～3L/㎡				
ピーマン（露地栽培）	タバコガ ハスモンヨトウ		100～300L/10a	収穫開始14日前まで		散布	
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 タマナギンウワバ			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類						
はくさい	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類				2回以内		2回以内 （は種時の土壌混和は1回以内
こまつな	アブラムシ類	1000			3回以内		3回以内
かぶ	アオムシ アブラムシ類			収穫7日前まで			2回以内
レタス	ヨトウムシ アブラムシ類	1000～2000		収穫21日前 まで	2回以内		2回以内 （植付時の土壌混和は1回以内）
	オオタバコガ ナメクジ類	1000					
サラダ菜	ヨトウムシ アブラムシ類	1000～2000					2回以内
	オオタバコガ	1000					
カリフラワー	ヨトウムシ アブラムシ類			収穫7日前 まで			
ブロッコリー	ヨトウムシ						
	アブラムシ類	1000～2000					
ほうれんそう	ヨトウムシ ミナミキイロアザミウマ			収穫14日前 まで	4回以内		4回以内
	アブラムシ類	1000					
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000～2000		収穫7日前 まで			
	クロバネキノコバエ類						
たまねぎ	ネギアザミウマ						
しょうが	ハスモンヨトウ						
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ			収穫21日前まで	2回以内		2回以内 （は種時の土壌混和は1回以内）
ばれいしょ	ジャガイモガ ナストビハムシ ニジュウヤホシテントウ	1000		収穫7日前 まで	5回以内		5回以内
	アブラムシ類	1000～2000					
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ						
だいず	ハスモンヨトウ シロイチモジマダラメイガ マメシンクイガ カメムシ類 ツメクサガ			収穫14日前まで	4回以内		4回以内
えだまめ				収穫7日前まで	3回以内		3回以内
てんさい	ヨトウムシ トビハムシ				5回以内		5回以内
にんじん	ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 クロバネキノコバエ類	1000			2回以内		2回以内 （は種前の土壌混和は1回以内）
パセリ	アブラムシ類	2000		収穫 30日前まで	1回		1回
茶	ハスモンヨトウ チャトゲコナジラミ	1000	200～400L/10a	摘採21日前まで	2回以内		2回以内
	コカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ ミドリヒメヨコバイ	1000～1500					
	チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ	1000～2000					
食用ゆり	クロバネキノコバエ類	500	―	植付前	1回	30 分間種球浸漬	1回
セルリー	ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類	1000	100～300L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
アスパラガス	ネギアザミウマ			収穫前日まで	1回		2回以内 （散布は1回以内、灌注は1以内）
	ナメクジ類		1～3L/㎡	収穫3日前まで		灌注	
にら	ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類		1L/㎡	収穫 21日前まで	2回以内		2回以内
	ネダニ類						
らっきょう							
ごぼう	アブラムシ類		100～300L/10a	収穫7日前まで			
チンゲンサイ	アブラムシ類			収穫14日前まで		散布	
たばこ	タバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～2000	25～180L/10a	収穫10日前まで			