作物名	適用病害虫名	使用液量 (/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メソミルを含む農薬 の総使用回数
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	3 <b>∼</b> 5kg	収穫14日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	コナガ タマナギンウワハ゛ アブラムシ類	4∼6kg				
だいこん	アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	3 <b>∼</b> 5kg	収穫21日前まで	2 回以内		2 回以内 (は種時の土壌混和 は 1 回以内)
	コナガ タマナギンウワハ゛ アブラムシ類	4 <b>∼</b> 6kg				
かんしょ	ハスモンヨトウ エビガラスズメ イモコガ ナカジロシタバ	3∼5kg	収穫7日前 まで	5 回以内		5回以内
	コガネムシ類幼虫	6kg				
ばれいしょ	ヨトウムシ	3∼5kg	収穫7日前 まで			
	アブラムシ類	4∼6kg				
はくさい	ネキリムシ類	6kg	収穫14日前まで	2 回以内	地表面散布	2回以内 (は種時の土壌混和 は1回以内)
だいず	ハスモンヨトウ シロイチモジマダラメイカ カメムシ類	4∼5kg	収穫14日前まで	4 回以内	散布	4 回以内
にんじん (北海道に限る)	キタネコブセンチュウ	20∼30kg	は種前	1 回	全面土壌混和	2回以内 (は種前の土壌混和 は1回以内)