

ツインターボフェルテラ箱粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ コブノメイガ 内穎褐変病	育苗箱(30×60×3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り50g	は種時(覆土前) ～移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に散布する。	
		高密度には種する場合は1k g/10a(育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50～ 100g)				
		育苗箱(30×60×3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り50g	は種時(覆土前)			
		高密度には種する場合は1k g/10a(育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50～ 100g)				
		穂枯れ (ごま葉枯病菌)	育苗箱(30×60×3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り50g		は種前	育苗箱の床土に 均一に混和する。
		いもち病 白葉枯病 内穎褐変病				育苗箱の床土又は覆 土に均一に 混和する
		穂枯れ (ごま葉枯病菌)	高密度には種する場合は1k g/10a(育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L)1箱当り50～ 100g)			育苗箱の床土に 均一に混和する。
		いもち病 白葉枯病 内穎褐変病				育苗箱の床土又は覆 土に均一に 混和する