

クレマート乳剤

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量(10a当り)		本剤の 使用回 数	使用 方法	ブタミホスを含む 農薬の総使用 回数	
			薬量	希釈水量				
メロン 漬物用メロン すいか 漬物用すいか かぼちゃ	一年生雑草	定植・マルチ前 (雑草発生前)	200~400ml		1回	全面土壌 散布	1回	
レタス なす		定植前又は定植・マル チ前(雑草発生前)						
キャベツ きゅうり いちご		定植前(雑草発生前)						
ねぎ わけぎ あさつき		定植活着後(雑草発 生前) 但し定植10日後 まで						
ばれいしょ さといも にんにく らっきょう やまのいも		植付後萌芽前 (雑草発生前)						
らっかせい にんじん パセリ		は種後発芽前 (雑草発生前)						
こんにやく		植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し収 穫120日前まで						
たまねぎ		春播栽培の定植後(雑 草発生前)但し 収穫60日前まで						
		秋播栽培の定植後(秋 季の雑草発生前)但し 収穫60日前まで						
アスパラガス		萌芽前(雑草発生前)						
ピーマン とうがらし類		定植前 (雑草発生前)						200ml
はくさい とうがん ブロッコリー ひろしまな								
うど								
わらび		株養成期(地上部な し)(雑草発生前)						200~400ml
グラジオラス		植付後(雑草発生前)						
きく(ポットマム)	定植後(雑草発生前)							
	アメリカネナ シカズラ	定植後 (雑草発生揃期まで)						
つつじ類	植付後又は生育期 (雑草発生前)	200ml	雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布	全面土壌 散布	3回以内			
たばこ (折衷マルチ栽培)	植付10日前まで (雑草発生前)							
ケナフ	播種後出芽前					300~400ml	全面土壌 散布	1回