ポルトフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	キザロホップエチルを含む農薬の総使用回数
			薬量（ml/10a）	希釈水量（L/10a）				
だいず	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草生育期（イネ科雑草の3～10葉期）収穫30日前まで	200～300	通常散布 50～100/10a 少量散布25～50/10a	1回	雑草茎葉散布または全面散布	—	1回
えだまめ		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）収穫14日前まで		100				
あずき		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）収穫50日前まで						
いんげんまめ							北海道	
にんじん		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）収穫45日前まで					—	
たまねぎ		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）収穫30日前まで			2回以内			2回以内
キャベツ					1回			1回
はくさい		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）収穫21日前まで						
だいこん		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）収穫14日前まで						
かんしょ		雑草生育期（イネ科雑草の3～10葉期）収穫14日前まで					全域（北海道を除く）	
やまのいも		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）収穫7日前まで					—	
ばれいしょ		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）収穫前日まで						
てんさい		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）収穫30日前まで			2回以内			2回以内
	シバムギ レッドトップ	雑草生育期（イネ科雑草の3～6葉期）収穫30日前まで	250～300ml					
なたね	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	雑草生育期（イネ科雑草の3～6葉期）収穫75日前まで	200～300ml					
いぐさ		雑草生育期（イネ科雑草の3～8葉期）			3回以内	雑草茎葉散布または全面散布（落水）		3回以内