カソロン粒剤4.5

作物名	適用場所	適用雑草	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	DBN を 含む農薬の 総使用回数
水田作物（水田畦畔）	水田畦畔	スギナ	秋冬期～春期（雑草発生前～発生始期	6～15kg/10a	1回	全面土壌散布	1回
		一年生雑草及び多年生広葉雑草（まめ科を除く）		6～12kg/10a			
水稲（刈取跡）	水稲刈取跡	一年生雑草	水稲刈取後秋期雑草発生前～発生始期	3kg/10a			
りんご	―	一年生雑草及び多年生広葉雑草（まめ科を除く）	秋冬期（11月～12月積雪前）	6～8kg/10a			
桑							
		一年生雑草	春期の雑草発生前～発生始期	7～8kg/10a			
樹木等	公園・庭園・堤とう駐車場・道路・運動場・宅地・のり面・鉄道 等	一年生雑草及び多年生広葉雑草	雑草発生前～発生始期	8～12kg/10a	3 回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	3回以内
		スギナ		8～15kg/10a			
いぐさ	―	一年生雑草及びマツバイミズハコベ	3 月上旬～4 月上旬	3kg/10a	2回以内	湛水散布	2回以内