

グラメックス水和剤

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量/10a		本剤の使用回数	使用方法	シアナジンを含む農薬の総使用回数				
				薬量	希釈水量							
ばれいしょ	—	一年生雑草	植付後 萌芽前	100～300g	100ℓ	1回	全面土壌散布	1回				
たまねぎ (直播栽培)			種後出芽前 (雑草発生前)	75～100g								
たまねぎ		一年生広葉雑草	定植活着後 (雑草発生前) 但し、収穫30 日前まで	50～100g					100ℓ	1回	全面土壌散布	1回
				100～200g								
		100～150g										
ねぎ		定植活着後 (雑草発生始期) 但し、収穫30 日前まで	50～150g	100ℓ					1回	全面土壌散布	1回	
アスパラガス		萌芽前又は 収穫後 (雑草発生前)	100～200g									
日本芝		一年生雑草	春期雑草 発生前									200～400g
			秋冬期雑草発生 初期	50～200g								
			桑	桑発芽前 (雑草発生前)					200～300g	100～ 200ℓ	2回以内	全面土壌散布
すぎ・ひのき (床替床)	雑草発生前	300～600g	3回以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に全面 土壌散布	3回以内							
樹木類						公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 宅地 運動場 のり面等	雑草発生前	300～600g	3回以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に全面 土壌散布	3回以内	