

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アセキノシル を含む農薬の 総使用回数	
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ チャノホコリダニ	1000~1500	200~700	収穫7日前まで	1回	散布	1回	
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ							
なし	ハダニ類	1000		収穫前日まで				
	ニセナシサビダニ							
ネクタリン	ハダニ類	1000~1500		収穫3日前まで				
	モモサビダニ	1000		収穫7日前まで				
もも	ハダニ類	1000~1500						収穫3日前まで
おうとう								
すもも								
ぶどう								
うめ								
ピーマン	チャノホコリダニ	1000	150~300	収穫7日前まで				
なす	ハダニ類	1000~1500			収穫前日まで			
きゅうり								
うり類(漬物用)								
すいか								
メロン								
いちご								
やまのいも						収穫3日前まで		
あずき						1000	200~700	収穫7日前まで
かぼちゃ								
ゴレンシ						200~700		
しそ	カンザワハダニ	1500	150~300	収穫21日前まで				
はすいも(葉柄)	ハダニ類			1000~1500	収穫前日まで			
さといも(葉柄)								
食用ぎく		収穫7日前まで						
きく(葉)		収穫21日前まで						
食用カーネーション		200~700	収穫3日前まで					
あけび(果実)			収穫30日前まで					
さんしょう(果実)			収穫7日前まで					
マンゴー			収穫3日前まで					
パパイヤ			200~400		摘菜7日前まで			
茶		150~300			収穫21日前まで			
食用パンジー	ハダニ類		1000~1500	—				
花き類・観葉植物 (ばら、きく、カー ネーション、デルフィ ニウムを除く)								
きく								
カーネーション								
デルフィニウム		シクラメンホコリダニ			1000	1000~1500		
	ハダニ類							