

ダニトロンフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フェンピロキシメートを 含む農薬の 総使用回数		
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ	1000～2000	200～700	収穫30日前まで	1回	散布	1回		
	リンゴサビダニ	2000							
かんきつ	ミカンサビダニ	1000～2000		収穫14日前まで	2回以内		1回	2回以内	
	ミカンハダニ								
なし	ハダニ類 ニセナシサビダニ	1000		収穫7日前まで	2回以内		2回以内		
もも	ハダニ類								
すもも									
ネクタリン									
うめ		1000～2000							
ぶどう	ブドウサビダニ	2000		収穫30日前まで	1回		1回		
アセロラ	ハダニ類	1000		収穫14日前まで	2回以内		2回以内		
おうとう									
かき		1000～2000		収穫7日前まで	1回				
びわ		ビワサビダニ					1000		
いちじく	イチジクモンサビダニ	2000		収穫3日前まで	1回		1回		
	ハダニ類	1000～2000		収穫前日まで					
キウイフルーツ	チャノホコリダニ		2000		収穫30日前まで	1回	1回		
チェリモヤ	カンザワハダニ								
あずき いんげんまめ えんどうまめ べにばないんげん	ハダニ類	1000～2000	150～300	収穫7日前まで	1回	散布	1回		
豆類 (未成熟、 但し、さやいんげん を除く)	チャノホコリダニ	1000							
さやいんげん	ハダニ類	1000～2000		収穫前日まで					
にがうり		2000		収穫3日前まで					
いちご	チャノホコリダニ	1000		収穫前日まで	3回以内		3回以内		
すいか メロン	ハダニ類	1000～2000							
きゅうり なす		2000							
ピーマン		1000～2000							
トマト ミニトマト	トマトサビダニ	1000		収穫開始 14日前まで	3回以内		3回以内		
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミ を含む)	1000～2000		収穫前日まで					
とうがらし類	ハダニ類	2000		収穫7日前まで	1回		2回以内		
モロヘイヤ				収穫21日前まで					
ほうれんそう				収穫28日前まで					
しそ				収穫前日まで					
はすいも(葉柄)				みょうが(花穂)	2000		収穫前日まで	1回	散布、 但し花穂の発生期 にはマルチフィルム 被覆により、 散布液が 直接花穂に 飛散しない状態で 使用する
みょうが(花穂)									
みょうが(茎葉)			みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合 にあつては開花期終了まで						
食用さくら(葉)			ナミハダニ	1000	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
てんさい									
ホップ			ハダニ類	200～700	収穫14日前まで	2回以内	2回以内		
茶			クワシロカイガラムシ	1000	摘採7日前まで				
			カンザワハダニ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ	400					
花き類・観葉植物			ハダニ類	1000～2000	150～300	発生初期	1回	6回以内	